


MIRANDO PÁJAROS

UNA GUÍA DE LAS AVES DEL CONCEJO DE AVILÉS



GRUPU D'ORNITOLOXÍA MAVEA - COLEUTIVU ECOLOXISTA D'AVILÉS

ESTA GUÍA HA SIDO ELABORADA POR ANTÓN, BRUNO, CÉSAR, DAVID, EMILIO,
GÜISI, JUANCAR, MARCOS, SENÉN, VITOR Y XELU.

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO / AYUDA A CONSERVAR NUESTROS BOSQUES.

INTRODUCCION

CUALQUIER LECTOR NO "PAJARITÓLOGO" SE SORPRENDERÁ DE LA GRAN VARIEDAD DE ESPECIES DE AVES VISTAS EN EL CONCEJO DE AVILÉS (242 ESPECIES) Y MÁS TODAVÍA SI CONSIDERAMOS EL PERIODO DE OBSERVACIONES: DESDE EL PRINCIPIO DE LOS AÑOS OCHENTA HASTA EL PRESENTE, 1990. EN ESTE TIEMPO TRANSCURRIDO, LA COMPOSICIÓN DE LA AVIFAUNA HA SIDO CONSTANTE A GRANDES RASGOS, PUES NO HUBO GRANDES TRANSFORMACIONES EN EL HÁBITAT. PERO SI NOS REMONTAMOS CUARENTA U OCHENTA AÑOS ATRÁS, QUEDARÍAMOS PASMADOS POR EL CONTRASTE QUE OBSERVARÍAMOS CON AQUELLAS ÉPOCAS: ALGUNAS CITAS DEL ESTUDIO DE GARAÍÑO (1913) INDICAN UNA MAYOR DIVERSIDAD DE ESPECIES, REFLEJO DE MEJORES Y EXTENSOS HÁBITATS. PERO A PARTIR DE 1950 CAMBIA TODO EL PANORAMA: LA INSTALACIÓN DE LA SIDÉRGICA ENSIDESA Y OTRAS INDUSTRIAS MODIFICA FUERTEMENTE LA RÍA DE AVILÉS, SEPULTANDO LA MAYORÍA DE SUS VALORES NATURALES. ÉSTO ORIGINÓ UN CRECIMIENTO DESMEDIDO DE LA POBLACIÓN AVILESINA A COSTA DE LOS BOSQUES AUTÓCTONOS.

LA SITUACIÓN ACTUAL ES DESOLADORA. UN VISTAZO A LA ZONA HACE HUIR AL ORNITÓLOGO MÁS PINTADO (COMO LES OCURRIÓ A LOS FRANCESES FOURNIER EN 1969). ESTE CONCEJO, UNO DE LOS MÁS PEQUEÑOS DE ASTURIAS CON SÓLO 25,34 KM²., HA SUSTITUIDO SUS BOSQUES AUTÓCTONOS POR GRANDES EXTENSIONES DE ESTÉRIL MONOCULTIVO DE EUCALIPTO. SÓLO ENCONTRAMOS UNAS POCAS MANCHAS DE CASTAÑO, CARBAYO Y HUMERO EN EL ÁREA OCCIDENTAL (FUERA DE LA URBE), APARTE DE LA MISCELÁNEA ARBÓREA DE LOS PARQUES URBANOS. UNOS PORCENTAJES DE CÓMO ESTÁ REPARTIDO EL CONCEJO SON: 7,97% DE CULTIVOS, 33,40% SON PRADOS, 29,59% ES BOSQUE Y MATORRAL (LA MAYORÍA OCAUITOS), 3,97% SON AGUAS Y EL 36,07% PERTENECE A LA URBE.

EN ESTA SITUACIÓN, ¿QUÉ PUEDE HACER CUALQUIER AVILESINO O FORÁNEO DISPUESTO A VER PÁJAROS?. SI ADOPTAMOS LA FILOSOFÍA INGLESA DE "BUSCAR NATURALEZA URBANA HASTA DETRÁS DE LA TAZA DEL RETRETE", ENTONCES TENDREMOS MUCHO QUE VER. EL LECTOR NOTARÁ QUE MUCHAS DE LAS AVES OBSERVADAS ESTÁN DE PASO, DEBIENDO ESTAR OJO AVIZOR EN LOS MESES CORRESPONDIENTES. SI DESEA VER PASERIFORMES Y OTRAS AVES FORESTALES O PRATENSES, ENTONCES TIENE MUCHA PRADERÍA QUE RECORRER, ALGUNOS BOSQUECILLOS QUE PROSPECTAR Y EL PARQUE DE FERRERA QUE CONTROLAR. SI PREFIERE AVES ACUÁTICAS (GAVIOTAS Y LIMÍCOLAS), HAY QUE ECHAR UN GÜEYO EN LOS LIMOS DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA; SOBRE TUDO JUNTO A ZE-

LUÁN, EN EL LÍMITE CON EL CONCEJO DE GOZÓN. EN EL PUEBLO DE ZELUÁN HAY UNA CASETA DE OBSERVACIÓN JUNTO A UNA CHARCA Y EN SU PLAYA ANEXA SE DESCUBRE EN BAJAMAR UNA EXTENSIÓN DE VEINTICINCO HECTÁREAS DE LIMOS, AUTÉNTICO IMÁN PARA LIMÍCOLAS.


LA PRESENTE GUÍA NO PRETENDE SER UNA RELACIÓN EXHAUSTIVA DE LAS AVES QUE HAY POR AQUÍ, DESDE LUEGO, SINO UN CÚMULO DE OBSERVACIONES DE UNOS "PAJARITÓLOGOS" AVILESINOS OBTENIDAS EN SUS CORRERÍAS (INCLUIMOS ALGUNAS CITAS NO PROPIAS). ESPERAMOS CON ELLA ANIMAR A LA GENTE PARA LLEGAR A CONOCER MEJOR A ESTOS BICHOS.

PARA CUALQUIER CONSULTA PODÉIS ESCRIBIR A:

G.O. MAVEA
APARTADO 385
33400 - AVILÉS

MIEMBRO DE LA COORDINADORA ORNITOLÓGICA D'ASTURIES Y LA COORDINADORA ECOLOXISTA D'ASTURIES.





EN ESTE MAPA SE REPRESENTAN LOS LÍMITES DEL CONCEJO DE AVILÉS CON SUS TRES CONCEJOS VECINOS. EN PUNTEADO SE INDICAN LAS DOS ZONAS CON LIMOS DESCUBIERTOS EN BAJAMAR. LAS ÁREAS SOMBREADAS REPRESENTAN EL SUELO INDUSTRIAL Y EL URBANO. LAS ÁREAS DESPEJADAS CORRESPONDEN A PRADERÍAS, ARBOLEDAS Y ZONAS RURALES, Y EL CÍRCULO CENTRAL REFIERE AL PARQUE DE FERRERA.

COLIMBOS, ZAMPULLINES Y SOMORMUJOS

SI QUERÉIS VER COLIMBOS NO BUSQUÉIS EN AVILÉS, PORQUE SÓLO SE VIO UNO: UN COLIMBO GRANDE EN LA RÍA EL 9.I.1986.

TAMBIÉN BASTANTE RAROS SON LOS ZAMPULLINES, A LO QUE SE SUMA SU PEQUEÑO TAMAÑO Y SUS CONSTANTES DESAPARICIONES BAJO EL AGUA. EL ZAMPULLÍN CHICO HA SIDO OBSERVADO EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EN ALGUNOS AÑOS, TANTO EN ZELUÁN COMO EN LA HOY SEPULTADA CHARCA DE MAQUA (QUE DIOS LA CONSERVE EN SU GLORIA). AL ZAMPULLÍN CUELLINEGRO SÓLO LO HEMOS ENCONTRADO DOS VECES: EL 24.XI Y EL 10.XII DE 1989 EN ZELUÁN:

EMPARENTADO CON ESTOS SE ENCUENTRA EL SOMORMUJO LAVANCO, QUE AL IGUAL QUE LOS OTROS REPRESENTANTES DE ESTA FAMILIA SE MUESTRA REACIO A APARECER POR NUESTRO CONCEJO: SÓLO TENEMOS CUATRO CITAS DE INDIVIDUOS EN PASO OTOÑAL O EN INVIERNO. AL OTRO SOMORMUJO, EL CUELLIRROJO, SÓLO SE TUVO EL PLACER DE CONTEMPLARLO EN UNA OCASIÓN (6 Y 7.I.1986), Y DEBIDO A LO "IMPOLUTO" DE LA ZONA HOY DESCANSA DISECADO SOBRE UN TELEVISOR.

PARDELAS Y PAÍÑOS

SEGÚN NUESTROS DATOS, ESTAS AVES PELÁGICAS RARA VEZ PENETRAN EN UNA RÍA. SÓLO HAY UNA OBSERVACIÓN, CON FOTOGRAFÍAS, DE UN EJEMPLAR VIVO, PETROLEADO Y EN MAL ESTADO, QUE TRAS UNA MINUCIOSA OBSERVACIÓN RESULTÓ SER UNA PARDELA SOMBRÍA (EN ZELUÁN, EL 12.XII.1981). EXISTE UNA CITA OTOÑAL DE HACE ALGUNOS AÑOS DE UNA PARDELA PICHONETA, TAMBIÉN PETROLEADA.

EL ÚNICO INDICIO DE PAÍÑOS CONOCIDO FUE EL HALLAZGO DE UN CADÁVER DE PAÍÑO DE LEACH EL 29.IX.1987 EN ZELUÁN.

ALCATRACES Y CORMORANES

COMPAÑERO DE LOS PESCADORES, CON LOS QUE COMPARTE SU DEDICACIÓN POR

LA PESCA, EL ALCATRAZ COMÚN PERMANECE JUNTO A NUESTRAS COSTAS BUENA PARTE DEL AÑO, PRINCIPALMENTE EN OTOÑO E INVIERNO. EN DÍAS FAVORABLES OBSERVAMOS ALGUNOS CERCA DE LA BOCANA DE LA RÍA, SIENDO BUENA ATALAYA PARA SU LOCALIZACIÓN EL CABO DE SAN JUAN DE NIEVA. UNA CITA INTERESANTE POR LO TARDÍO ES LA DE UN AVE ADULTA Y UN JOVEN DE PRIMER VERANO, EL 31.V.1989. SU COSTUMBRE DE LANZARSE EN PICADO PARA PESCAR LES HACE ENREDARSE CON CIERTA FRECUENCIA EN LAS REDES DE LOS PESCADORES. MUESTRA DE ELLO SON LAS CABEZAS QUE APARECEN EN ZELUÁN ARRASTRADAS POR LAS MAREAS OTOÑALES Y QUE PRESENTAN RESTOS DE LA MALLA MORTAL QUE LAS SECCIONÓ. EL 8.V.1988 LLEGÓ A ARRIBAR UN AVE INMADURA VIVA, COMPLETAMENTE LIADA EN UNA RED, SIENDO RECUPERADA Y LIBERADA UNA SEMANA DESPUÉS.

LOS CORMORANES TIENEN UNA ESTAMPA INCONFUNDIBLE CUANDO SE POSAN EN LUGARES, GENERALMENTE ELEVADOS, A LA ORILLA DEL AGUA, CON LAS ALAS ABIERTAS PARA SECAR SU PLUMAJE, DADO QUE EL AVE NO POSEE LAS SUSTANCIAS GRASAS QUE LO HACEN IMPERMEABLE. EN CONSECUENCIA, NADAN CON LA LÍNEA DE FLOTACIÓN MUY ALTA Y PUEDEN SUMERGIRSE CON FACILIDAD, YA QUE EL PLUMAJE EMPAPADO PESA MÁS. EL CORMORÁN GRANDE RESIDE EN LA RÍA, CON VARIOS INDIVIDUOS DESDE SEPTIEMBRE HASTA ABRIL, INCLUSO A VECES DE AGOSTO A MAYO Y ALGUNA OBSERVACIÓN ESTIVAL; TODOS LOS AÑOS SE SUPERAN ALGUNOS DÍAS LAS DIEZ AVES, PERO EN DOS OCASIONES SE HAN LLEGADO A REGISTRAR 35. DE SU PARIENTE, EL CORMORÁN MOÑUDO, SÓLO TENEMOS UNA CITA DENTRO DE LA RÍA: UN ADULTO EL 1.III.1989; APARTE, HAY VARIAS OBSERVACIONES DE AVES JUVENILES EN LA BOCANA DE LA RÍA, EN OTOÑO E INVIERNO.



GARZAS Y AFINES

ESTAS AVES DEBEMOS BUSCARLAS EN LOS LIMOS DE ZELUÁN. DE UNA DE LAS MÁS BELLAS, LA NÍVEA GARCETA COMÚN, SÓLO ENCONTRAMOS VARIOS INDIVIDUOS EN ABRIL, MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. ES IRREGULAR DE UN AÑO A OTRO. COMO DATO EXCEPCIONAL, 79 AVES, EN DOS BANDOS, ESTABAN POSADAS EL 27.IX.

1987 EN LOS LIMOS, DURANTE UN TEMPORAL. ES UN BUEN ESPECTÁCULO CON-
TEMPLAR SU TÉCNICA DE PESCA, CORRIENDO Y ALETEANDO SOBRE LOS BANCOS
DE PECES.



GARZA REAL

LA GARZA REAL ES LA MÁS ABUNDANTE Y FAMILIAR DE LAS ARDEIDAS, SOBRE TODO EN SEPTIEMBRE Y RESTO DEL OTOÑO; OCASIONAL EN INVIERNO, ALGUNOS AÑOS SE AVISTA EN ABRIL Y MAYO, Y EN MESES ESTIVALES. LAS OBSERVACIONES SON DE INDIVIDUOS SOLITARIOS O EN GRUPOS DE HASTA DIEZ GARZAS, SIENDO RAROS LOS BANDOS DE MÁS DE VEINTE. DURANTE LOS PASOS MIGRATORIOS, ESPECIALMENTE EN EL OTOÑAL, SUELEN VERSE ALGUNAS SOBREVOLANDO ALTAS EL CONCEJO; EL MAYOR GRUPO ANOTADO FUE DE 24 AVES EL 30.VIII.1990 SOBRE EL QUIRINAL. EN CLARO CONTRASTE, SU "PRIMA" LA GARZA IMPERIAL ÚNICAMENTE NOS LA TROPEZAMOS EN DOS OCASIONES, EN ZELUÁN: UN AVE EL 23.IX.1983 Y UN INMADURO EL 12.V.1988.

UN RARO VISITANTE QUE APARECIÓ UNA SOLA VEZ, ENTRE LAS ESPADAÑAS DE LA CHARCA DE ZELUÁN, FUE UNA HEMBRA DE AVETORILLO EL 25.IV.1980.

AVE CARACTERÍSTICA, QUE NO PASA DESAPERCIBIDA, ES LA CIGÜEÑA COMÚN. TUVIMOS LA SUERTE DE VER UN EJEMPLAR SOBREVOLANDO LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD EL 16.IV.1986 Y EL 14.III, 28.IV Y 23.V.1990 Y CUATRO AVES JUNTAS EL 12.IX.1988. PARECE QUE SU MIGRACIÓN AUMENTA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

OTRO BICHO INCONFUNDIBLE, PERO MÁS RARO, ES LA ESPÁTULA. SE VIO EN DOS OCASIONES EN ZELUÁN: TRES INDIVIDUOS EN EL III.1984 Y UN JOVEN EL 27 Y 28.IX.1987 (DENTRO DE UN BANDO DE GARCETAS).


PERO MÁS INCONFUNDIBLE, ACCIDENTAL Y MARAVILLOSO ES EL FLAMENCO. UN AVE DE ESTA SINGULAR ESPECIE SOBREVOLÓ ZELUÁN EN EL IX.1985, SEGÚN "LAS CRÓNICAS".

PATERÍA

LA MAYOR ANÁTIDA QUE PASA POR AQUÍ ES EL **ÁNSAR COMÚN**. ANTES DE 1987 SOLAMENTE TENÍAMOS UN PAR DE CITAS (UN INDIVIDUO EN LA CHARCA DE MAQUA EL 28.X.1983 Y SIETE AVES CERCA DEL FARO DE SAN JUAN DE NIEVA EL 2.II.1985). PERO A PARTIR DE ESE AÑO SE LE OBSERVA SIEMPRE EN OTOÑO, ENTRE FINALES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE, GENERALMENTE EN ZELUÁN. DURANTE EL EXCEPCIONAL PASO DEL 30.X.1988, 72 AVES EN DOS BANDADAS SOBREVOLARON LA ENSENADA Y OTRO GRUPO DE 25 GANSOS PASÓ SOBRE EL FARO DE SAN JUAN DE NIEVA. SUELE VÉRSELE DURANTE UN SÓLO DÍA, PERO EN EL XI.1989 UNO SE QUEDÓ DURANTE UNA SEMANA (!INCREDIBLE!). SE SALE DE LA FENOLOGÍA OTOÑAL EL AVISTAMIENTO DE UN INDIVIDUO EL 7.IV.1990.

UN PATO DE BELLO PLUMAJE, EL **TARRO BLANCO**, SE DEJA VER MUY POCO POR AVILÉS; APENAS UNA OBSERVACIÓN INVERNAL HACE UNOS CUANTOS AÑOS Y VARIAS ASOCIADAS A LA OLA DE FRÍO DE 1987: EN ZELUÁN, 11 AVES EL 14.I, UNA EL 18.I Y OTRA EL 20.II. ESPERAMOS VOLVER A VERLO EN LA PRÓXIMA NEVADA COSTERA.

EL GRUPO DE LOS ÁNADES LO FORMAN PATOS SIMILARES, CON MACHOS DE VISTOSO COLORIDO (SALVO EN EL ECLIPSE) Y HEMBRAS PARDAS. EL MÁS COMÚN Y FAMILIAR




ÁNADE REAL

ES EL **ÁNADE REAL**; APARECE EN ZELUÁN, AUNQUE IRREGULARMENTE, EN CUALQUIER ÉPOCA, PERO SOBRE TODO EN OTOÑO. CASI TODOS LOS AÑOS SE VE UN INDIVIDUO SOLITARIO, QUE SUELE SER HEMBRA O INMADURO. DEL RARILLO **ÁNADE RABUDO** HAY UNA CITA AISLADA, DE UN MACHO EL 29.III.1982. MÁS OBSERVADO ES EL **ÁNADE DE SILBÓN**, CON UNA CITA INVERNAL HACE AÑOS, UNA HEMBRA EL 1 Y EL 8.II.1987 Y OTRA EL 11.XI.1989 EN ZELUÁN, Y OTRA EL 9.I.1985 EN LA CHARCA DE MAQUA. MEJOR VISITANTE QUE TODOS LOS ANTERIORES ES LA **CERCETA COMÚN**.

FRECUENTE EN LA CHARCA DE ZELUÁN EN OTOÑO, SOBRE TODO EN NOVIEMBRE, HAY OBSERVACIONES INVERNALES ASOCIADAS A OLAS DE FRÍO Y UNA CURIOSA APARICIÓN ESTIVAL (2.VII.1989). LA MAYORÍA DE LAS AVES ERAN HEMBRAS O INMADUROS, QUE PERMANECÍAN A VECES UNOS CUANTOS DÍAS AQUÍ. CON EL PRECIOSO MACHO DE ESTA ESPECIE SÓLO NOS HEMOS DELEITADO EN UN PAR DE OCASIONES. MÁS ESPECTACULAR ES EL MACHO DE LA **CERCETA CARRETONA**; A ESTE LO HEMOS CONTROLADO VARIAS VECES, AUNQUE ES UN PATO MÁS ESCASO QUE EL ANTERIOR Y NO APARECE TODOS LOS AÑOS. ES VISIBLE SOBRE TODO EN ABRIL, Y A VECES EN MAYO Y EN SEPTIEMBRE. INCONFUNDIBLE POR EL TAMAÑO DE SU PICO ES EL **PATO CUCHARA**. ES UN BICHO IRREGULAR PUES SÓLO APARECIÓ TRES AÑOS, EN AGOSTO, DICIEMBRE Y ENERO RESPECTIVAMENTE.

CON UNA ÚNICA OBSERVACIÓN ESTÁ EL **PATO COLORADO**: DOS HEMBRAS O JÓVENES EN LA DESAPARECIDA CHARCA DE MAQUA Y EN ZELUÁN EL 5 Y EL 11.VIII.1984.

ENTRE LOS PORRONES, EL RARO **OSCU** LADO SOLAMENTE SE VIO UNA VEZ DURANTE UN TEMPORAL (UNA HEMBRA EL 17.XI.1979) MIENTRAS QUE EL **COMÚN** APARECIÓ VARIAS VECES: EN LA DIFUNTA CHARCA DE MAQUA, UN MACHO EL 15.III.1984 Y UN JUVENIL EL 14.VIII.1985; EN ZELUÁN, UNA HEMBRA EL 14 Y EL 18.I.1987, OTRA EL 1.XI.1988 Y UN MACHO EL 11.V.1990. Y DE OTRO ESCASO, EL **PORRÓN BASTARDO**, SÓLO VIMOS UNA HEMBRA EN LA CHARCA DE MAQUA EL 25.XI.1985, AUNQUE HACE AÑOS PARECE QUE HUBO OBSERVACIONES DURANTE TODO UN INVIERNO EN LA BOCA NA DE LA RÍA.



PORRÓN COMÚN

EL **NEGRÓN COMÚN** ES OTRO PATO CON INCLINACIONES OTOÑALES, AUNQUE NO TENEMOS SU ESTATUS BIEN DEFINIDO. PARECE QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SU MES CLAVE ES NOVIEMBRE, QUEDÁNDOSE EN UNA OCASIÓN HASTA FINALES DE AÑO; HAY UNA CITA A MEDIADOS DE MAYO EN 1985 Y 1988. LLEGAN UNA O DOS AVES, AUNQUE EL 15.V.1988 CUATRO MACHOS Y UNA HEMBRA PASARON CERCA DE LA BOCA NA DE LA RÍA. ÚNICAMENTE SE HA VISTO UN INDIVIDUO DE **NEGRÓN ESPECULAR** DO EL 17.X Y EL 22.XI.1988 JUNTO A LA BOCA NA DE LA RÍA. DEL TEÓRICAMENTE MUY RARO PATO **HAVELDA** YA TENEMOS TRES CITAS: UN MACHO JOVEN PERMANECE EN LA CHARCA DE ZELUÁN DEL 23 AL 28.X.1982 MURIENDO AL DÍA SIGUIENTE; OBSERVAMOS UN MACHO ADULTO UN INSTANTE EN LA PLAYA DE ZELUÁN EL 20.XI.

1988; Y UNA HEMBRA O JOVEN ES RECOGIDA EN EL PUERTO EL 10.XII.1988 Y LIBERADA AL MOMENTO.

EL VOLUMINOSO EIDER COMÚN SE ALLEGÓ A LA RÍA EN UNA OCASIÓN: UN MACHO JOVEN PERMANECIÓ DESDE EL 29.X.1988 HASTA EL 14.I.1989. TANTO ESTA ESPECIE COMO LA ANTERIOR APARECEN EN UNA TEMPORADA EN QUE FUERON VIS-TAS EN OTROS SITIOS ASTURIANOS.

LAS SERRETAS SON ANÁTIDAS INCONFUNDIBLES POR SU CABEZA Y SU PICO. AQUÍ SÓLO HEMOS OBSERVADO LA **MEDIANA**; APARTE DE UNA CITA INVERNAL DE HACE AÑOS, VIMOS UN MACHO DEL 26 AL 29.II.1988 Y UNA HEMBRA O INMADU-RO EL 17 Y EL 18.IV.1988 Y EL 22 Y EL 24.IV.1989.

RAPACES DIURNAS



LA MAJESTUOSA ÁGUILA URBANA, EL **RATO NERO COMÚN**, ES UNA DE LAS RAPACES MÁS FRECUENTES, VIÉNDOSELA SOBREVOLAR CUALQUIER PARTE. ES SEDENTARIO, AUNQUE SU NÚMERO AUMENTA EN SEPTIEMBRE, DEBIDO AL PASO OTOÑAL. CRÍAN VARIAS PAREJAS EN EL CONCEJO. DOS NIDOS CONTROLADOS EN V Y VI.1990 PROPORCIONARON LOS SIGUIENTES DATOS: UNO DE LOS NIDOS ESTABA A UNOS SEIS METROS DEL SUELO SOBRE LA COPA DE UN PINO INMERSO EN UN BOSQUE DE EUCALIPTOS; ERA UN NIDO VOLUMINOSO, CON UN DIÁMETRO MÁXIMO DE 90 CM. Y MEDIO DE 70 CM. SEGÚN REFERENCIAS, LLEVA OCUPADO AL MENOS TRES AÑOS; EL 21.V TENÍA DOS POLLOS, CON INICIOS DE PLUMAS

COBERTORAS, QUE DÍAS DESPUÉS FUERON EXPOLIADOS. EL OTRO NIDO ERA NUEVO, CON UN DIÁMETRO DE 55 CM EN EL INTERIOR DE UN AUISO A UNOS SEIS METROS SOBRE EL SUELO, EN UNA HILERA DE ALISOS; EL 21.V TENÍA DOS HUEVOS BLANCOS CON VARIAS MANCHAS PARDAS Y EL 15.VI HABÍA UN POLLO CON PLUMÓN GRIS Y RESTOS MUY RECIENTES DEL OTRO POLLO, QUE ERA ENANO Y HABÍA SIDO DEVORADO POR SU HERMANO (CAINISMO). DÍAS DESPUÉS EL POLLO FUE EXPOLIADO. ENTRE AMBOS NIDOS EXISTÍA UN TERCERO, PERO EL PINO HA SIDO TALADO ESTE AÑO; ESTE NIDO TAMBIÉN FUE EXPOLIADO EL AÑO PASADO, SIEMPRE POR CHAVALES DE LA ZONA.

LA ALIMENTACIÓN DE ESTA RAPAZ HA SIDO ESTUDIADA EN EL CONCEJO. CASI LA MITAD DE SUS PRESAS CORRESPONDEN A LOS INSECTOS, SOBRE TODO EL GRILLOTOPO; HAY TAMBIÉN ALGÚN PAJARILLO, UNOS CUANTOS ESCULIBIERTOS (LUCIONES) Y BASTANTES ROEDORES (A PARTES IGUALES MUSARAÑAS, TOPILLOS Y TOPOS). SUS EGAGRÓPILAS SE ENCUENTRAN EN LOS CAMPOS BAJO POSTES DE LA LUZ, QUE SON SUS POSADEROS TÍPICOS. SIMILAR ES EL HALCÓN ABEJERO, AL QUE SÓLO SE VIO EL 8.V Y EL 8.VIII.1989.



RATONERO COMÚN

DE OTRAS ÁGUILAS, TENEMOS NOTICIAS DEL **ÁGUILA CALZADA** (UN AVE EL 25. IV.1990) Y DEL **ÁGUILA CULEBRERA**; AL PARECER ESTA CLARA RAPAZ CRIÓ EN ARBOLEDAS CERCANAS A HEROS HASTA 1978, PERO NO SE LA HA VUELTO A VER. TAMBIÉN ÁGUILA, PERO DE DIFERENTE FAMILIA QUE LA ANTERIOR, ES LA **PESCADORA**: OBSERVAMOS SUS ESPECTACULARES PICADOS TANTO EN PRIMAVERA COMO EN OTOÑO; APARECEN INDIVIDUOS SOLITARIOS DESDE FINALES DE MARZO HASTA MAYO Y EN SEPTIEMBRE, SIEMPRE EN ZELUÁN, CON ABUNDANCIA VARIABLE DE UN AÑO A OTRO.

EN CUANTO A LOS MILANOS, DEL **REAL** HAY ALGUNA CITA OTOÑAL, MIENTRAS QUE DEL **NEGRO** HAY VARIAS EN EL PASO PRIMAVERAL, UNA ESTIVAL (UN AVE EL 12.VI.1984) Y ALGUNA OTOÑAL. MÁS ESCASOS SON LOS AGUILUCHOS: EL **CENIZO** SÓLO SE LOCALIZÓ UNA VEZ UN VERANO HACE UNOS CUANTOS AÑOS, MIENTRAS QUE EL **PÁLIDO** SE ATISBÓ POCAS VECES EN EL LÍMITE SUR DEL CONCEJO, DEBIDO A QUE POSIBLEMENTE CRÍA CERCA.

UNA DE LAS MÁS BELLAS RAPACES QUE PASAN POR EL CONCEJO ES EL **AZOR**. ESTA MAGNÍFICA AVE SE SUELE OBSERVAR AISLADAMENTE EN LOS PASOS MIGRATORIOS, ESPECIALMENTE ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE, Y HAY ALGUNAS CITAS ENTRE FEBRERO Y MAYO. EL OCCIDENTE DEL CONCEJO ALBERGA LAS MEJORES CAMPERAS Y ARBOLEDAS PARA VERLO, PRINCIPALMENTE INMADUROS, PERO TAMBIÉN PRECIOSOS ADULTOS; Y ES AHÍ DONDE ENCONTRAMOS CUATRO DESPLUMADEROS DE ARREDAJOS Y DOS DE PALOMAS DOMÉSTICAS, Y ALUCINAMOS CONTEMPLANDO UN ATAQUE A UNA PALOMA Y A UNA VARRACA. SIMILAR, PERO MÁS PEQUEÑO, ES EL

GAVILÁN, RAZA MÁS ABUNDANTE Y VISIBLE INCLUSO SOBRE LA CIUDAD. SE OBSERVA



GAVILÁN

TODO EL AÑO, DADO QUE CRÍA CERCA DEL CONCEJO, PERO ABUNDA MÁS DE AGOSTO A DICIEMBRE (POR EL PASO MIGRATORIO OTOÑAL). HEMOS ENCONTRADO DOS DESPLUMADEROS DE MIRLO COMÚN Y UNO DE GORRIÓN COMÚN, Y TUVIMOS LA SUERTE DE VERLO CAZAR UN BISBITA COMÚN, UN GORRIÓN COMÚN Y UN CORRELIMOS (ÉSTE ÚLTIMO EN ZELUÁN).

EN EL GRUPO DE LOS HALCONES, EL MÁS FÁCIL DE OBSERVAR ES EL CERNÍCALO VULGAR. TODO EL AÑO (MÁS FRECUENTE EN OTOÑO) SOBREVUELA EL CONCEJO, INCLUIDA LA CIUDAD Y LOS PARQUES URBANOS. SE LE VE REPETIDAMENTE ACECHANDO DESDE UN POSTE O CERNIÉNDOSE Y LANZÁNDOSE SOBRE ALGÚN INSECTO O MICROMAMÍFERO. UN ESTUDIO DE SU ALIMENTACIÓN EN LA ZONA REFLEJÓ QUE SE NUTRÍA TANTO DE TOPILLOS COMO DE MUSARAÑAS, ASÍ COMO DE BASTANTES ESCARABAJOS. LA FRECUENCIA EN SU OBSERVACIÓN SE DEBE A QUE CRÍA MUY CERCA DEL CONCEJO. OTROS HALCONES MÁS ESCASOS SON EL ESMEREJÓN (ESCASAS CITAS ALGUNOS INVIERNOS) Y EL ALCOTÁN. ÉSTE APARECE EN MAYO Y MARCHA EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE. QUIZÁS ALGÚN AÑO LLEGA A CRIAR DENTRO DEL CONCEJO, PERO SÍ LO HACE SEGURO EN SUS INMEDIACIONES. SU PRESENCIA ES IRREGULAR DE UN AÑO A OTRO, PUES UNOS AÑOS SE VE



CERNÍCALO VULGAR

MUY POCO Y OTROS POR MUCHOS SITIOS. LO HEMOS ENCONTRADO EN TODAS PARTES: CAMPERAS EN EL OCCIDENTE DEL CONCEJO, PARQUES URBANOS, CALLES O PICANDO SOBRE LIMÍCOLAS EN ZELUÁN.

EL HALCÓN POR ANTONOMASIA ES EL PEREGRINO O COMÚN: LOS AVILESINOS TENEMOS EL PRIVILEGIO DE QUE DOS PAREJAS DE ESTA ESPECIE CRÍEN CERCA DEL CONCEJO, POR LO QUE PODEMOS VERLOS FÁCILMENTE TODO EL AÑO EN CUALQUIER SITIO (DESDE EL PUERTO A LOS PRADOS, PASANDO POR LA URBE). PERO EL MEJOR LUGAR ES ZELUÁN: EN ABRIL Y MAYO (Y MUCHO MENOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ES FÁCIL EXTASIARSE ANTE LOS INCREÍBLES PICADOS QUE REALIZA ESTA RA-

HALCÓN PEREGRINO



PAZ SOBRE LOS BANDOS DE LIMÍCOLAS, Y PUESTO QUE MUCHOS ATAQUES SON BALDÍOS PODEMOS DISFRUTAR DE UNOS CUANTOS EN UN SOLO DÍA. DURANTE EL FINAL DEL VERANO Y EL OTOÑO ES FÁCIL VER INMADUROS AISLADOS, ADULTOS O HASTA GRUPOS FAMILIARES (DE CINCO INDIVIDUOS) PICANDO SOBRE LOS ABUNDANTES PALOMARES EN LA CIUDAD Y LOS BARRIOS.

UN ESTUDIO SOBRE SU DIETA REALIZADO PRINCIPALMENTE CON DATOS DE SU ZONA DE CRÍA, AUNQUE SE ABASTECE MAYORITARIAMENTE EN EL CONCEJO, REVELA QUE EL 40% DE SUS PRESAS SON PALOMAS DOMÉSTICAS, LAS CUALES APORTAN MÁS ENERGÍA QUE GRAN PARTE DEL RESTO DE SU ALIMENTACIÓN (PRINCIPALMENTE AVES VARIAS, ALGUNOS ROEDORES Y UN MÍNIMO DE ESCARABAJOS).

FAISANES Y CODORNICES

EL CONOCIDO FAISÁN VULGAR NOS HA ASUSTADO EN VARIAS OCASIONES AL ECHAR EL VUELO RUIDOSAMENTE CASI ENTRE NUESTROS PIES; LO VEMOS EN MAQUA (Y UNA VEZ EN LA CHARCA DE ZELUÁN) EN OTOÑO O INVIERNO. SE TRATA DE AVES, GENERALMENTE HEMBRAS, QUE PROCEDEN DE LAS REINTRODUCCIONES QUE SE HACEN EN EL CONCEJO DE GOZÓN (Y QUE DEBEN SER PERIÓDICAS, YA QUE SE LOS CARGAN A TODOS AL POCO DE SOLTARLOS).

DESDE MEDIADOS DE ABRIL, Y SOBRE TODO EN MAYO Y JUNIO, SE ESCUCHA EL INCONFUNDIBLE CANTO DE LA **CODORNIZ** EN LOS PRADOS DE HIERBA ALTA DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL CONCEJO. CRIAN ALGUNAS PAREJAS, PUES SE HAN DESCUBIERTO ALGUNOS NIDOS CERCA DE HEROS. LA ÚNICA FORMA DE OBSERVARLAS ES ANDAR ENTRE LAS HIERBAS, HASTA QUE TE SALE UNA DE ENTRE LOS PIES Y DA UN CORTO VUELO.

GRULLAS, POLLAS Y SIMILARES

POR DESGRACIA, SÓLO UNA VEZ HEMOS OBSERVADO A LA GRAN **GRULLA COMÚN** POR AQUÍ: DOS AVES SOBREVOLABAN EL CAMPO DE FUTBOL DE AVILÉS DURANTE UN TEMPORAL EL 5.XI.1989.

EL **RASCÓN** ES UN ANIMAL OCULTADIZO Y MÁS BIEN NOCTURNO. ÚNICAMENTE SE HABÍA OBSERVADO UN INDIVIDUO EN LA CHARCA DE MAQUA EN LA PRIMAVERA DE HACE UNOS CUANTOS AÑOS Y SE ENCONTRÓ UN CADÁVER EN LA CHARCA DE ZELUÁN HACE TIEMPO. PERO, PARA NUESTRO DELEITE, UN ADULTO INVERNÓ EN ESTA DESDE EL 19.XI.1988 HASTA AL MENOS EL 28.I.1989, OTRO DESDE EL 7.XI.1989 HASTA AL MENOS EL 27.I.1990 Y SE VIO UNO EL 4.III.1990. PRESTA UN MONTÓN VER ESTE BICHO.

LA **FOCHA COMÚN** ES UN AVE CONOCIDA Y VULGAR QUE, SIN EMBARGO, HA SIDO MUY POCO OBSERVADA EN AVILÉS: UN EJEMPLAR EN LA MALOGRADA CHARCA DE MAQUA DEL 23.X AL 3.XI.1984 Y OTRO EN ZELUÁN EL 28.IV.1989.

UNA DE LAS AVES ACUÁTICAS MÁS POPULARES ES LA GALLINETA (**POLLA DE AGUA**). APARECE EN CUALQUIER HUMEDAL DE MÍNIMA ENTIDAD. CRIÓ EN UNA CHARCA CERCANA A LAS MEANAS HASTA 1983, AL AÑO SIGUIENTE ESTABA SÓLO DE PASO Y EN 1985 LA CHARCA FUE SEPULTADA. TAMBIÉN LLEGÓ A CRIAR EN UN RIACHUELO DE LA CARRIONA EN 1988 Y EN LA CHARCA DE MAQUA, PERO ESTE ÚLTIMO ENCLAVE CORRIÓ LA MISMA SUERTE QUE EL DE LAS MEANAS EN 1989. HOY SOLAMENTE ES SEDENTARIA EN LA CHARCA DE ZELUÁN, CON DOS PAREJAS NIDIFICANTES QUE SACAN UNA O DOS POLLADAS AL AÑO, DE HASTA 8 POLLOS EN LA PRIMERA Y 3 Ó 4 EN LA SEGUNDA. SE HA DETECTADO PASO OTOÑAL Y PRESENCIA DE AVES INVERNANTES. DURANTE LOS PASOS PUEDEN CONTEMPLARSE EN CUALQUIER ZONA HÚMEDA (SE VIO UNA EN EL ESTANQUE DEL PARQUE DE FERREIRA EN LA ÚLTIMA DECENA DEL V.1990).

LIMÍCOLAS


ES ESTE UN GRUPO CON MUCHAS ESPECIES, MUY PARECIDAS ENTRE SÍ PARA EL PROFANO. COMO INDICA SU NOMBRE GUSTAN DEL LIMO Y, POR TANTO, NO HAY MEJOR SITIO PARA OBSERVARLAS QUE ZELUÁN (AUNQUE ALGUNAS ESPECIES LAS HEMOS VISTO EN PRADOS DEL OCCIDENTE DEL CONCEJO). HACE AÑOS ENTRABAN MUCHAS AVES EN SU CHARCA DURANTE LA PLEAMAR, PERO ÚLTIMAMENTE PARECE QUE YA NO LES GUSTA TANTO.



OSTREO

DE FRÍO LLEGAN BANDOS QUE PUEDEN QUEDARSE VARIOS DÍAS. (COMO EN EL I Y II. 1987). EN PASO PRIMAVERAL LA VIMOS POCAS VECES EN MARZO Y ABRIL, Y UNA VEZ EN MAYO. NORMALMENTE LLEGAN UNA

UNO DE LOS LIMÍCOLAS MÁS ATRAYENTES ES EL OSTREO. POR DESGRACIA, ES IRREGULAR DE UN AÑO A OTRO Y SIEMPRE ESCASO, APARECIENDO MUY POCO LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS. EN OTOÑO PUEDE VERSE DESDE FINALES DE JULIO HASTA DICIEMBRE, PREFERENTEMENTE EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE. EN PRIMAVERA HAY ESCASAS CITAS EN MARZO, ABRIL Y MAYO. A DESTACAR LA INVERNADA DE 5 AVES EN 1986.87. OTRO GRAN LIMÍCOLA ES LA AVOCETA, SIMILAR AL ANTERIOR EN IRREGULARIDAD Y ESTATUS, PERO ALGO MÁS ABUNDANTE. EN OTOÑO APARECE DE FINALES DE AGOSTO A DICIEMBRE, SOBRE TODO EN ESTE MES Y EN SEPTIEMBRE. CON LAS OLAS




AVOCETAS

O POCAS AVES, PERO HAY DATOS DE 10 Y MÁS INDIVIDUOS Y EN UNA OCASIÓN HASTA 31 EN UN BANDO (10.XII.1987). TAMBIÉN DE BUEN TAMAÑO Y COLORIDO ES LA CIGÜEÑUELA. ESTA ES MÁS REGULAR. SE ENCUENTRA CASI SIEMPRE EN LA CHARCA DE ZE-

ZELUÁN, CASI TODOS LOS AÑOS EN ABRIL Y ESPECIALMENTE EN MAYO (Y ALGUNA VEZ EN MARZO). SUELE TRATARSE DE UNAS POCAS AVES, PERO EL 2.V.1989 ATERRIZÓ UN BANDO DE UNAS ¡30 AVES!. MÁS RARO QUE LOS ANTERIORES ES EL **ALCARAVÁN**, DEL QUE SÓLO SE CONOCEN TRES CITAS DE AVES SOLITARIAS: EL 6.XII.1978 Y EL 4.II.1980 UN INDIVIDUO SOBREVUELA MAQUA Y EL 16.III.1988 APARECE UN CADÁVER RECIENTEMENTE ATACADO POR UN HALCÓN EN ZELUÁN (¡TAMBIÉN ES MALA SUERTE, HOMBRE!).

LOS CHORLITEJOS CONSTITUYEN UN SUBGRUPO CON TRES ESPECIES EUROPEAS, VISIBLES EN ZELUÁN CON DIFERENTES ESTADOS. EL **CHORLITEJO GRANDE** ES EL MÁS ABUNDANTE: ES VISTO EN CUALQUIER MES, AUNQUE ESCASEA EN VERANO E INVIERNO; LOS MESES TRADICIONALES DE PASO DE UNÍCOLAS (ABRIL Y MAYO; AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE) SON LOS MEJORES PARA OBSERVARLO. EL MÁXIMO NÚMERO DE AVES UN DÍA DE PRIMAVERA ES DE 400, Y DE 70 EN OTOÑO. MUCHO MÁS ESCASO ES EL **CHORLITEJO CHICO**, DEL QUE APARECEN UNA O POCAS AVES (MÁXIMO DE 15) EN ABRIL, MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. HAY ALGUNA CITA DE MARZO Y UNAS CUANTAS EN JUNIO Y JULIO (DE ESTAS SOBRESALE LA PAREJA AFINCADA EN LA CHARCA EL VERANO DE 1988, CON COMPORTAMIENTO NUPCIAL, PERO QUE NO LLEGÓ A CRIAR). EL **CHORLITEJO MÁS ESCASO** ES EL **PATINEGRO**, ADEMÁS DE IRREGULAR, PUESTO QUE SU NÚMERO VARÍA DE UN AÑO A OTRO Y EN OTOÑO SÓLO APARECE ALGUNOS AÑOS. PRINCIPALMENTE SE OBSERVAN EN ABRIL Y MAYO UNA O POCAS AVES (MÁXIMO DE 10 EL 16.IV.1987), HAY UNA CITA EN MARZO Y JUNIO Y ESCASAS ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE.



CHORLITEJO GRANDE

EN AVILÉS SE VEN DOS ESPECIES DE CHORLITOS. EL **CHORLITO DORADO** ES MUY IRREGULAR DE UN AÑO A OTRO Y APARECE EN CUALQUIER MES, SIEMPRE CON POCOS INDIVIDUOS. ES FRECUENTE ENCONTRARLO EN ZELUÁN EN MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, OCASIONALMENTE EN INVIERNO ACOMPAÑANDO A LAS OLAS DE FRÍO: ENTONCES INCLUSO ABUNDA POR LOS PRADOS ASOCIADO A LAS AVEFRÍAS. EN ESTAS CONDICIONES SE OBSERVA EN LOS PRADOS OCCIDENTALES DEL CONCEJO (ASÍ, 4 AVES CERCA DE GAXÍN EL 8.II.1986). EL **CHORLITO GRIS** ES MUCHO MÁS REGULAR Y ABUNDANTE: EN PRIMAVERA SE TROPIEZA DE FINALES DE MARZO A MAYO, CON ALGUNA CITA EN JUNIO. EN MAYO SE ALCANZAN LOS MÁXIMOS ANUALES: 30 A 60 AVES, UNA VEZ 175 EL 8.V.1989. HACE AÑOS, AL PARECER, ERA MÁS ESCASO. EL PASO OTOÑAL, CON ALGUNA CITA DE AGOSTO, VA DE SEPTIEMBRE A NOVIEM

BRE (ALGÚN AÑO NO SE VE NINGUNO). EN INVIERNO SUELE APARECER CON OLAS DE FRÍO: UN BANDO DE 15 AVES SE QUEDÓ A PASAR EL INVIERNO DE 1988.89.




MÁS POPULAR QUE LOS POLLOS (NOMBRE LOCAL PARA LOS LIMÍCOLAS DE TAMAÑO PEQUEÑO O MEDIO) ES LA SIRIGÜEYA O AVEFRÍA. CON LAS FAMOSAS OLAS DE FRÍO INVADE EL CONCEJO A CIENTOS DE AVES, QUE SE TOPAN POR TODOS LADOS. EN INVIERNOS NORMALES APARECE IRREGULARMENTE, VIÉNDOSE A VECES BUENOS BANDOS EN DICIEMBRE Y FEBRERO. CIERTOS AÑOS SE ATISBA ALGÚN EJEMPLAR EN EL PASO PRIMAVERAL (MARZO, ABRIL Y MAYO); INCLUSO LA VIMOS UNA VEZ EN JULIO Y OTRA EN AGOSTO. EN OTOÑO LLEGAN POCAS AVES ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE; ÉSTE MES HEMOS VISTO ALGÚN BANDO DE MÁS DE 100 AVES Y TAMBIÉN HAY ALGUNAS CITAS EN PRADOS DEL OCCIDENTE DEL CONCEJO.

DENTRO DE LAS LIMÍCOLAS, EL SUBGRUPO MÁS REPRESENTATIVO ES EL DE LOS CORRELIMOS. ENTRE LOS FRECUENTES, EL GORDO, ES EL DE MAYOR TAMAÑO QUE PODEMOS ENCONTRAR. INCONFUNDIBLE POR SU ROJO VIENTRE Y PECHO EN PRIMAVERA, LO VEMOS SOBRE TODO EN MAYO (MÁXIMO DE 121 AVES EL 4.V.1989), ES ESCASO EN ABRIL Y JUNIO Y HAY UNA CITA DE MARZO. EN OTOÑO ESTÁ PRESENTE DESDE FINALES DE AGOSTO HASTA OCTUBRE Y POCAS VECES EN NOVIEMBRE; SEPTIEMBRE ES SU MEJOR MES, AUNQUE ES RARO QUE PASE DE LAS 10 AVES. OTRO BICHO LLAMATIVO ES EL CORRELIMOS TRIDÁCTILO. SU FENOLOGÍA ES SIMILAR A LA DEL ANTERIOR, AUNQUE ES MÁS VISIBLE EN ABRIL Y AGOSTO (NO EN MARZO). EL MÁXIMO DE MAYO ES DE 86 AVES (1987), HAY POCAS CITAS EN JULIO; EL MÁXIMO DE SEPTIEMBRE ES DE 35 AVES (1988) Y HAY UN PAR DE CITAS INVIERNALES. EL MÁS PEQUEÑO DEL CLAN ES EL



AVEFRÍA



CORRELIMOS COMÚN

MENUDO, AL QUE GENERALMENTE SE OBSERVA EN LA CHARCA DE ZELUÁN. ALGUNOS AÑOS NO APARECIÓ EN PRIMAVERA (SI LO HIZO FUE MUY ESCASO EN MAYO Y SÓLO UNA VEZ EN ABRIL) MIENTRAS QUE EN OTOÑO ES REGULAR: SE VE ENTRE AGOSTO Y A VECES NOVIEMBRE, ALCANZANDO MÁXIMOS EN SEPTIEMBRE (NO SUELE LLEGAR A 10 AVES, PERO UNA VEZ CONSIGUIÓ LAS 25). MÁS DESAPERCIBIDO PASA EL **ZARAPITÍN**. ES ESCASO EN ABRIL Y MAYO (MÁXIMO DE 8 EN EL V.1989), HAY MUY POCAS CITAS EN JUNIO Y NOVIEMBRE, Y MÁS FRECUENTE ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE (MÁXIMO DE 57 AVES EN EL IX. 1988). PERO EL MÁS CONOCIDO Y ABUNDANTE DE LOS CORRELIMOS (Y DE LOS LIMÍCOLAS EN ZELUÁN) ES EL **COMÚN**: NOS LO ENCONTRAMOS EN CUALQUIER MES, ESPECIALMENTE EN MAYO (MÁXIMO DE 2.000 AVES EL 8.V.1989) Y SEPTIEMBRE (MÁXIMO DE 300 EL 18.IX.1990), AUNQUE ESCASEA EN LOS MESES ESTIVALES E INVERNALES. ALGUNOS AÑOS UNA O DOS AVES INVERMAN AQUÍ.

ADEMÁS DE LOS ANTERIORES, HAY CUATRO ESPECIES DE CORRELIMOS RAROS: EL **FALCINELO**, QUE SÓLO NOS ALUCINÓ UNA VEZ (UN INDIVIDUO EL 6.V.1989); EL **PECTORAL**, QUE YA SE AVISTÓ TRES VECES (UNA HEMBRA JOVEN DEL 1 AL 5.X.1982, UNA HEMBRA ADULTA DEL 21 AL 26.IX.1983 Y UN JOVEN DEL 11 AL 17.IX.1988); EL

DE TEMMINCK (UN AVE DOS DÍAS DEL V.1981, UNO EN EL VIII.1982, DOS INDIVIDUOS EL 7 Y EL 8.V.1987 Y UNO EL 21 Y EL 24.V.1989) Y EL **OSCURO** (EN MUY POCAS OCASIONES EN LA BOCANA DE LA RÍA HACE UNOS CUANTOS AÑOS).




EL **COMBATIENTE** ES UNA ESPECIE CONOCIDA POR LA BELLEZA Y ESPECTACULAR

RIDAD DE SUS MACHOS; POR DESGRACIA, ÚNICAMENTE UNA VEZ NOS EXTASIAMOS CON UN MACHO ADULTO EN PLUMAJE ESTIVAL NARANJA (V.1989) PUES TODAS LAS DEMÁS AVES QUE CONTROLAMOS SUELEN SER JÓVENES. APARECE EN ABRIL Y MAYO (MÁXIMO EXCEPCIONAL DE 96 AVES EL V.1989), POCAS VECES EN MARZO Y JUNIO Y ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE (UN MÁXIMO DE 20 AVES EN EL IX.1986).

DE LAS AGACHADIZAS, LA CHICA APENAS FUE VISTA UNAS POCAS VECES HACE AÑOS (UN INDIVIDUO EN EL XI Y EL XII.1980 Y OTRO EL 14.IX.1981) MIENTRAS QUE LA COMÚN ES MEJOR CONOCIDA. HAY ESCASAS CITAS PRIMAVERALES DE ELLA EN ZELUÁN EN ABRIL Y EN OTOÑO ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE (LLEGANDO A 9 AVES EN EL IX.1990). EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAY UNA POBLACIÓN INVERNANTE EN LA CHARCA DE ZELUÁN: 29 EJEMPLARES EL INVIERNO DE 1987.88, 14 AVES EL DEL 1988.89, 15 EL DE 1989.90, ENTRE NOVIEMBRE Y FEBRERO, RARA EN MARZO. HEMOS LEVANTADO ALGUNOS INDIVIDUOS EN PRA-DOS DEL OCCIDENTE DEL CONCEJO EN INVIERNO, COSA QUE TAMBIÉN HACEN LOS CAZA-DORES. DE MORFOLOGÍA SIMILAR A LAS ANTERIORES ES LA CHOCHA PERDIZ (O AR-CEA, O BECADA). ESTE INTERESANTE BICHO LO LEVANTAMOS MUY POCAS VECES A LA ORILLA DE ARBOLEDAS EN EL OCCIDENTE DEL CONCEJO (DATOS SEGUROS SON UN AVE EL 15. I.1985, OTRA EL 16.XI.1985 Y DOS EL 14.I.1987).

DENTRO DEL MISMO "SACO" ESTÁN CLASIFICADOS AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y AN-DARRÍOS, GRUPO MÁS VARIADO QUE EL DE LOS CORRELIMOS. ENTRE LAS FORMAS ABUN-DANTES TENEMOS A LA AGUJA COLIPINTA. COMO EN LA MAYORÍA DE LIMÍCOLAS, SUS MEJORES MESES SON ABRIL Y MAYO (MÁXIMO DE 76 AVES) Y AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE (MÁXIMO DE 100 BICHOS), MIENTRAS QUE ES MUY ESCASA EN MARZO, JUNIO, JULIO Y NOVIEMBRE. ALGUNOS AÑOS APARECE EN LOS MESES INVERNALES, SOBRE TODO SI HAY OLAS DE FRÍO. LA AGUJA COLINEGRA ES MUCHO MÁS RARA E IRREGULAR. EN OCASIONES SE VE ALGÚN INDI-VIDUO EN ABRIL O MAYO Y A VECES ALGUNOS ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE (AUNQUE UN BANDO DE 14 AVES PERMANECIÓ AQUÍ EN EL IX.1987); HAY MUY POCAS CITAS EN LOS RESTANTES MESES DEL AÑO.



AGUJA COLIPINTA

EL ZARAPITO MÁS FRECUENTE EN AVILÉS ES EL TRAINADOR. NO SUELE SUPERAR LAS 50 AVES EN ABRIL Y MAYO, AUNQUE ESPORÁDICAMENTE LLEGA A LAS 100. EN OTOÑO ES MENOS ABUNDANTE, VIÉNDOSE DESDE JULIO HASTA SEPTIEMBRE (UN MÁXIMO DE 17 EJEMPLARES)

Y EN POCAS OPORTUNIDADES EN JUNIO Y OCTUBRE. EL **ZARAPITO REAL** ES ESCASO EN ABRIL Y MAYO (HUBO UN MÁXIMO EXCEPCIONAL DE 29 AVES EL IV.1985, DEBIDO A LA PERMANENCIA ANTERIOR DE UN BANDO), HAY ALGUNA CITA DE JUNIO Y ES IGUALMENTE RARO ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE. DURANTE EL INVIERNO PUEDEN LOCALIZARSE ALGUNOS INDIVIDUOS, SOBRE TODO CON TIEMPO FRÍO (50 AVES EN EL II Y EL III.1985), PERO AUN CON TIEMPO NORMAL UN BANDO DE 50 AVES PERMANECIÓ DESDE EL XII.1989 AL III.1990.

DE LOS ARCHIBEBES EL MÁS COMÚN ES EL **COMÚN** (LÓGICO ¿NO?). EN ABRIL Y MAYO TIENE SUS MESES PRINCIPALES (MÁXIMO DE 300 EN EL V.1987), SIENDO MÁS ESCASO EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE (NO LLEGA A LAS 20 AVES EN UNA JORNADA); ES MUY RARO EN JUNIO, JULIO Y OCTUBRE Y HAY MUY POCAS CITAS EN ENERO, MARZO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. EL **ARCHIBEBE OSCURO** ES IRREGULAR (ALGÚN AÑO NI SIQUIERA SE VIO) E INFRECUENTE; VEMOS UNA O POCAS AVES (MÁXIMO 5) EN ABRIL Y MAYO (Y EN UNA OCASIÓN EN MARZO), Y EN OTOÑO UNO O DOS INDIVIDUOS ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE. MÁS FAMILIAR ES EL **CLARO**, PRINCIPALMENTE EN ABRIL Y MAYO (CON UN MÁXIMO EXCEPCIONAL DE 110 BICHOS EL 4.V.1989) Y CON MENOS FRECUENCIA EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE (MÁXIMO DE 15 AVES EN EL VIII.1983); ESCASEA MUCHO EN JUNIO, JULIO Y OCTUBRE Y EXISTE UNA CITA EN DICIEMBRE. HAN APARECIDO DOS RAROS ARCHIBEBES: EL **FINO** (UN ADULTO EL 20.IV.1985) Y EL **PATIGUALDO CHICO** (UN JOVEN DEL 10 AL 23.X.1984).

ENTRE LOS ANDARRÍOS, EL MÁS ABUNDANTE EN TODAS PARTES ES EL **CHICO**: SUS MÁXIMOS SE DAN EN ABRIL Y MAYO (15 AVES) Y DE MEDIADOS DE JULIO A SEPTIEMBRE (20 AVES), MESES EN LOS QUE SE OYE SU CARACTERÍSTICO RECLAMO, HASTA SOBREVOLANDO PRADOS DEL OCCIDENTE DEL CONCEJO, E INCLUSO PASANDO DE NOCHE SOBRE LA CIUDAD. ES RARO EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE, Y HAY ALGUNA CITA EN FEBRERO, MARZO Y JUNIO; A VECES SE ENCUENTRA EN INVIERNO (UN AVE INVERNÓ DESDE EL XI.1987 HASTA EL I.1988). MUY PARECIDO FÍSICAMENTE A ESTE ES EL **ANDARRÍOS MACULADO**, PERO ES ACCIDENTAL: UN EJEMPLAR EL 24 Y EL 25.V.1989. IRREGULAR Y POCO COMÚN ES EL **ANDARRÍOS GRANDE**, CON ALGUNAS OBSERVACIONES EN ABRIL Y MAYO (MÁXIMO, 8 BICHOS), UNA EN JUNIO Y CON LIGERAMENTE MAYOR FRECUENCIA EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE (UN MÁXIMO DE 7 AVES). SIMILAR ES EL **BASTARDO**; HASTA HACE POCO SÓLO HABÍA UNA CITA PRIMAVERAL, PERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LO HEMOS AVISTADO EN VARIAS OPORTUNIDADES EN ABRIL Y MAYO (MÁXIMO, 5 AVES), MUY POCAS OCASIONES EN MARZO, JUNIO Y JULIO, Y MUY RARAMENTE EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

UN BICHO INTERESANTE, COLORIDO Y CON PERSONALIDAD ES EL **VUELVEPIEDRAS**. DURANTE LA PRIMAVERA NOS VISITA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y EN MAYO (CON UN MÁXIMO DE 42 EN EL V.1989). HAY UNA CITA EN JUNIO Y EN JULIO, Y EN EL PASO OTOÑAL APARECE EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y MUY ESCASAMENTE EN OCTUBRE. ES CARACTERÍS-


TICO VERLO EN LOS PEDREROS VOLTEANDO LOS GUIJARROS.

LIMÍCOLAS DE VISITA OCASIONAL SON LOS FALAROPOS. HAY VARIAS CITAS INVERNALES DE HACER UNOS CUANTOS AÑOS DEL FALAROPO PICOGRUESO, ADEMÁS DE SUS DOS FAMOSAS INVASIONES: 50 AVES DEL 12 AL 25.X.1982 Y OTRAS TANTAS DEL 4 AL 11.X.1984, AMBAS DURANTE TEMPORALES. PERO DESDE AQUELLA NO HA VUELTO A VERSE (SALVO UN CADÁVER EL 9.I.1988). SIN DUDA, EL PÁJARO MÁS RARO VISTO POR LA COMARCA ES EL FALAROPO DE WILSON: UN JOVEN EN LA CHARCA DE ZELUÁN DEL 25 AL 28.VIII.1984.

PÁGALOS, GAVIOTAS, CHARRANES Y ALCIDOS

LO DICHO AL PRINCIPIO PARA LOS COLIMBOS ES APLICABLE A LOS PÁGALOS: SI LOS QUERÉIS VER NO ASOMÉIS LES NAPIES POR AQUÍ. DEL PÁGALO GRANDE SE CONOCE UNA CITA, LA DE DOS AVES EL 29.XII.1989 CERCA DE LA BOCANA DE LA RÍA, AUNQUE ESTE ANIMAL NO DEBE SER TAN RARO. EL PÁGALO PARÁSITO SÓLO SE CONTEMPLÓ UNA VEZ: UN ADULTO DE FASE OSCURA EL 8.XI.1988 EN ZELUÁN.

DEL VARIOPINTO GRUPÚSCULO DE LAS GAVIOTAS YA SE HAN CONTABILIZADO 14 ESPECIES. SIN A LUGAR, LA MÁS REPRESENTATIVA ES LA GAVIOTA PATIAMARILLA, CONSIDERADA ANTES UNA SUBESPECIE DE LA ARGÉNTA. SU ABUNDANCIA SE DEBE A LOS DESPERDICIOS PROVENIENTES DEL PUERTO PESQUERO Y LA RÍA Y A LA PROXIMIDAD DE DOS BUENAS COLONIAS DE CRÍA: LA ISLA LA DEVA Y EL CABO PEÑAS. DURANTE EL INVIERNO, EN ENERO, ALCANZA SU MÁXIMO POBLACIONAL, RONDANDO LOS 2.000 EJEMPLARES, Y EN PRIMAVERA EL MÍNIMO CON 200 A 400 AVES ENTRE MARZO Y MAYO. EN VERANO LA POBLACIÓN AUMENTA PROGRESIVAMENTE, CON UNA FUERTE SUBIDA EN AGOSTO DEBIDO AL ABANDONO DE LAS COLONIAS DE CRÍA. ESTOS INCREMENTOS Y DESCENSOS NO SON CONTINUOS, AL EXISTIR FRECUENTES FLUCTUACIONES, A VECES DEL DOBLE DE INDIVIDUOS. SUS PRINCIPALES POSADEROS




GAVIOTA PATIAMARILLA

SON LOS TEJADOS PRÓXIMOS AL PUERTO PESQUERO, LOS LIMOS DESCUBIERTOS POR LA BAJAR EN LA ZONA MEDIA DE LA RÍA Y ZELUÁN. EN CUALQUIER MOMENTO SURCAN LOS CIELOS DEL CONCEJO, SOBRE TODO AL AMANECER Y AL ATARDECER EN SUS PERIPLOS DIÁRIOS HACIA LOS DORMIDEROS O COLONIAS DE CRÍA. EN INVIERNO BAJAN A COMER A LOS PRADOS HÚMEDOS (COMO BIEN SABEN LOS ÉMULOS DE AOVITA QUE ACUDEN A ENTRENAR AL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL).

LAS RESTANTES ESPECIES SE OBSERVAN SOLAMENTE EN LA RÍA. OTRA GAVIOTA OMNIPRESENTE ES LA **SOMBRÍA**, AUNQUE EN INVIERNO POCAS VECES SUPERA LAS 100 AVES (SUELE RONDAR LAS 60). LA POBLACIÓN BAJA EN PRIMAVERA A 10-20 BICHOS O MENOS, PERO EN ABRIL Y MAYO ATERRIZAN EN LOS LIMOS ALGUNOS BANDOS MIGRATORIOS DE HASTA UN CENTENAR DE AVES. A LO LARGO DEL VERANO LA POBLACIÓN VA AUMENTANDO, Y YA EN AGOSTO SE DETECTA ALGÚN BANDO CERCAÑO A LOS 100 INDIVIDUOS. LO MISMO SUCEDE EN SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MES EN QUE SE HA REGISTRADO EL MÁXIMO CONTEO EN LA RÍA: 176 AVES, EN 1989. ESTA ESPECIE TAMBIÉN SUFRE ALTIBAJOS, PERO MENOS MARCADOS QUE EN LA ANTERIOR. MUY POCAS VECES SE LA VE SOBREVOLANDO EL RESTO DEL CONCEJO.



LA OTRA GAVIOTA FRECUENTE EN AVILÉS ES LA **REIDORA**: SUS EFECTIVOS INVERNANTES VARÍAN SEGÚN LOS AÑOS DE 300 A 900 AVES APRECIÁNDOSE UN DESCENSO BRUSCO HASTA SÓLO UN 10% DE ESA CANTIDAD A MEDIADOS DE FEBRERO. EN PRIMAVERA ABANDONA LA RÍA Y AUNQUE EN ABRIL Y MAYO PUEDEN LLEGAR BANDOS DE UN CENTENAR DE AVES LO NORMAL ES QUE ÚNICAMENTE ENCONTREMOS UNOS POCOS EJEMPLARES EN ESA ÉPOCA. A MEDIADOS DE JUNIO COMIENZA EL PASO OTOÑAL, ALCANZANDO EN SEPTIEMBRE NÚMEROS SIMILARES A LA INVIERNA DA. ESTA GAVIOTA SUFRE ALTIBAJOS MODERADOS IGUAL QUE LA SOMBRÍA. EN INVIERNO ALGUNAS VECES BUSCA LOS PRADOS HÚMEDOS.



GAVIOTA REIDORA

LA GAVIOTA MÁS PEQUEÑA QUE SE OBSERVA POR EL LUGAR ES LA **ENANA** (O.K.). EN

ZELUÁN HAY ALGUNAS REFERENCIAS, EN SEPTIEMBRE, OCTUBRE E INVIERNO, DE INDIVIDUOS SOLITARIOS, JÓVENES EN SU MAYORÍA. APARTE DE ESTO, LA CONTEMPLAMOS EN DOS OCASIONES EN LA PRIMAVERA DE 1989: UN BANDO DE 17 AVES EL 22.IV Y UNA EL 8.V.


UNA GAVIOTA PELÁGICA POCO CORRIENTE ES LA TRIDÁCTILA; SÓLO EN DÍAS FAVORABLES DE INVIERNO (SOBRE TODO CON FUERTES VIENTOS) APARECE ALGUNA EN LA RÍA, PERO ESTO RARA VEZ OCURRE. ADEMÁS, SE ENCONTRÓ UNA ADULTA PETROLEADA EL 25.V.1989.

OTRA PELÁGICA MÁS ESCASA ES LA DE SABINE, ESPECIE DE LA QUE NADA MÁS EXISTEN DOS DATOS DURANTE TEMPORALES: 21 INDIVIDUOS EL 4.X.1984 Y UNA ADULTA EL 10.X.1987.

LA GAVIOTA CABECINEGRA ES PARECIDA A LA REIDORA PERO MUCHO MENOS FRECUENTE: HASTA EL AÑO PASADO HABÍA MUY POCAS CITAS OTOÑALES Y ALGUNA INVERNAL, PERO EN CONSONANCIA CON SU AUMENTO POBLACIONAL LA VIMOS VARIAS VECES EN MAYO (UN MÁXIMO DE 5 BICHOS EN UNA JORNADA), UNA EN AGOSTO, OTRAS POCAS EN SEPTIEMBRE Y VARIAS ENTRE OCTUBRE Y FEBRERO (NORMALMENTE, EJEMPLARES JÓVENES).

LA CANA APARECE LA MAYORÍA DE LOS AÑOS ENTRE NOVIEMBRE Y MARZO (PRINCIPALMENTE EN ENERO Y MARZO), CON MUY POCAS OBSERVACIONES POR TEMPORADA, SIEMPRE DE INMADUROS. COMO GRAN EXCEPCIÓN ESTÁ LA PERMANENCIA ESTIVAL DE UN AVE (ALGUNOS DÍAS ERAN DOS) ENTRE EL V Y EL VIII.1989.

MUY PARECIDA A ÉSTA ES LA GAVIOTA DE DELAWARE (UNA RAREZA VENIDA A MENOS), CON UNA ÚNICA VISITA: UN PRIMER INVIERNO EL 22.XII.1989.



HAY REGISTRADAS AQUÍ CINCO ESPECIES MAYORES QUE LA PATIAMARILLA. MUY SIMILAR A ELLA, Y ANTES COESPECÍFICA, ES LA ARGÉNTEA. EL ESTUDIO DE SU FENOLOGÍA ES DEMASIADO SUPERFICIAL DADAS LAS DIFICULTADES PARA DIFERENCIAR LOS INMADUROS DE AM-

BAS ESPECIES. AUN ASÍ, COMPROBAMOS QUE VARIOS INDIVIDUOS (5 COMO MÁXIMO) INVERNAN POR LA RÍA DE DICIEMBRE A FEBRERO; EN JUNIO REAPARECE ALGÚN ANIMAL, AL QUE SE SUMAN OTROS A LO LARGO DEL VERANO Y EL OTOÑO (NO TODOS LOS DÍAS DETECTAMOS AVES); LA MAYORÍA SON INMADUROS.

UN BICHO MUY RARO E INCREIBLE ES EL GAVIÓN CABECINEGRO: HAY UNA CITA DE UN AVE ADULTA EL 1.XI.1980 EN ZELUÁN. EL OTRO GAVIÓN (EL EUROPEO) ES MÁS "COMÚN". TODOS LOS AÑOS HAY ALGUNA REFERENCIA INVERNAL, ESPECIALMENTE EN ENERO Y EN VARIAS OCASIONES HAN INVERNADO UNA O DOS AVES EN LA RÍA (ADULTOS Y JÓVENES) ENTRE NOVIEMBRE Y MARZO.

LOS "MONSTRUOS BLANCOS" SON LAS GAVIOTAS HIPERBÓREA Y POLAR. LA PRIMERA YA SE PRESENCIÓ TRES VECES (AVES INMADURAS SOLITARIAS EL 14.XII.1982, EL 30.III.1989 Y EL 24.III.1990) Y LA SEGUNDA EN UNA ÚNICA OCASIÓN (UN INMADURO DEL 12.II. AL 10.III.1984).

LOS CHARRANES SON "NÍVEOS GAVIOTINES" QUE NOS VISITAN EN LOS PASOS MIGRATORIOS. EL CHARRÁN PATINEGRO ES EL MÁS COMÚN, AUNQUE IRREGULAR PUES ALGUNOS AÑOS SE VE POCO. EN PRIMAVERA ARRIBA ENTRE MARZO Y JUNIO, PRINCIPALMENTE EN ABRIL Y MAYO, NORMALMENTE CON MENOS DE 20 AVES POR JORNADA (PERO EXCEPCIONALMENTE 113 EN EL V.1989). EN PASO POSTNUPIAL PUEDE PRESENTARSE YA EN JULIO, EN AGOSTO Y MÁS EN SEPTIEMBRE (NUNCA MÁS DE 5 AVES).

MUY IRREGULAR Y ESCASO ES EL CHARRÁN COMÚN: CIERTOS AÑOS NO LO VEMOS POR AQUÍ. EN PRIMAVERA PUEDE ENCONTRARSE ALGUNO A FINALES DE MAYO (MÁXIMO DE 9); ES MÁS NORMAL EN JUNIO (MÁXIMO, 15 AVES), HAY ALGUNAS CITAS EN JULIO Y UNA EN OCTUBRE Y GENERALMENTE SE OBSERVA EN SEPTIEMBRE, AUNQUE EN BAJA CANTIDAD. FUERON EXCEPCIONALES LOS 78 QUE APARECIERON CON UN TEMPORAL EL 1.IX.1988.

SIMILAR PERO MÁS RARO ES EL ÁRTICO, DEL QUE SE CONOCEN POCAS OBSERVACIONES: UN INDIVIDUO EL 18.V.1984, OTRO EL 8.VI.1988, DOS EL 10.VI.1988 Y ALGUNA CITA OTOÑAL DE HACE AÑOS.

EL MÁS PEQUE ES EL CHARRANCITO. NO LO CONOCEMOS EN PRIMAVERA. SU PRESENCIA MÁS TEMPRANA ES DE JUNIO (EXCEPCIONALMENTE 13 AVES EN EL VI.1988). EN JULIO VIMOS VARIAS VECES ADULTOS CEBANDO A JÓVENES DEL AÑO. ES MUY ESCASO EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

PARECIDO A LOS CHARRANES ES EL FUMAREL CARIBLANCO, QUE SE HA CONTROLADO EN TRES OPORTUNIDADES: UN ADULTO EL 14.IV.1988, DOS DEL 12 AL 14.V.1988 Y AL-

OTRA APARICIÓN PRIMAVERAL DE HACE AÑOS. EL FUMAREL MÁS CONOCIDO ES EL COMÚN, PERO AQUÍ ES MUY POCO FRECUENTE: CERCA DE LA BOCANA DE LA RÍA HAY VARIAS OBSERVACIONES DE ALGUNAS AVES EN MAYO Y JUNIO; DURANTE EL OTOÑO SE VE EN SEPTIEMBRE (UN MÁXIMO DE 7 AVES EL 1.IX.1988), PERO SOLAMENTE ALGUNOS AÑOS.

LAS MAYORES DE ESTE VARIOPINTO SUBGRUPO SON LAS **PAGAZAS PIQUIRROJA** Y **PICONEGRA**, RARILLAS POR ESTOS LARES: LA PRIMERA SE OBSERVÓ EN LA BOCANA DE LA RÍA A PRINCIPIOS DEL PASO OTOÑAL HACE AÑOS, Y UN ADULTO ESTIVAL DE LA OTRA NOS PASÓ VOLANDO MUY CERCA EL 27.IX.1987 Y EL 2.X.1990 EN ZELUÁN.

DEMASIADO ESCASOS SON LOS ÁLCIDOS EN LA RÍA (QUIZÁ NO LES GUSTA EL PESCADO POCHO), SIENDO MÁS FÁCILMENTE DIVISABLES FUERA DE LA BOCANA DE LA RÍA. ANTES DE 1988 NADA MÁS HABÍAMOS ENCONTRADO SUS CADÁVERES ARRASTRADOS POR LA MAREA. EN ESE AÑO POR FIN VEMOS EJEMPLARES DE **ALCA COMÚN** VIVOS: UN BANDO DE UNAS 20 EN LA BOCANA EL 26.II, UN ADULTO EL 10.VI EN EL MISMO SITIO Y OTRO INDIVIDUO EN ZELUÁN EL 9.V Y EL 23.XI. EL **ARAO COMÚN** SE DESCUBRIÓ AL AÑO SIGUIENTE: CERCA DE LA BOCANA UN INMADURO EL 13.V Y OTROS DOS Y UN ADULTO EL 31.V. CREEMOS QUE AMBAS ESPECIES DEBEN SER DE APARICIÓN ANUAL EN ESTA ZONA.



PALOMAS Y CUCCO

TODO EL MUNDO SABE LO QUE ES UNA PALOMA DADA LA PLAGA URBANA QUE CONSTITUYE LA **PALOMA BRAVÍA** DOMESTICADA. EN AVILÉS NO SE ALCANZAN LOS IMPORTANTES PROBLEMAS QUE ESTA ESPECIE PROVOCA EN OTRAS CIUDADES, PERO SÍ HAY AQUÍ UN BUEN NÚMERO DE AVES. SEGÚN DATOS DE 1990 DE LA SOCIEDAD COLOMBÓFILA AVILESINA, EN ESTE CONCEJO EXISTEN 33 PALOMARES QUE EN CONJUNTO SUMAN 2.048 PALOMAS. PERO NO TODAS LAS URBANÍCOLAS PALOMAS ESTÁN REGISTRADAS EN PALOMARES. EN UN CENSO QUE REALIZAMOS ESTE MISMO VERANO DETECTAMOS CUATRO ZONAS DE CRÍA ASILVESTRADA: TEJADOS DEL PALACIO DE CAMPOSAGRADO (UNOS 150 EJEMPLARES), SABUGO (15 INDIVIDUOS), RIVERO (45 BICHOS) Y VER-

SALLES (113 AVES). ESTAS INCONTROLADAS PALOMITAS "SEMISALVAJES" SUFREN UNA CURIOSA PATOLOGÍA: ACABAN TRANSFORMANDO SUS PATAS EN GRANDES Y DEFORMES MUÑONES. ESTO SE DEBE A QUE SE ENREDAN CON HILOS EN SUS PERIPLOS CALLEJEROS. UNA PALOMA MÁS GORDA Y TOTALMENTE SILVESTRE ES LA TORCAZ. POR DESGRACIA, NUESTROS DIMINUTOS BOSQUES CADUCIFOLIOS IMPIDEN QUE ESTA ESPECIE SEA MÁS FRECUENTE; SÓLO OBSERVAMOS ALGUNOS EJEMPLARES SOBREVOLAR LOS CAMPOS ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE, PRINCIPALMENTE EN SEPTIEMBRE. CRÍA MUY CERCA DEL CONCEJO.

MÁS ESBELTAS SON LAS TÓRTOLAS, SIENDO LA COMÚN BIEN VISIBLE EN LOS PASOS MIGRATORIOS. LAS PRIMERAS LLEGAN EN LA SEGUNDA MITAD DE ABRIL, Y LAS ÚLTIMAS APARECEN EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE; LOS MEJORES MESES SON MAYO, CUANDO SE REGISTRAN GRUPOS PEQUEÑOS, Y SEPTIEMBRE, CON BANDOS A VECES NUMEROSOS. MUY AQUEERENCIADA A LOS ÁRBOLES, CREEMOS QUE ALGUNA PAREJA PUEDE CRIAR EN ARBOLEDAS DE LA PERIFERIA DEL CONCEJO. ES IRREGULAR EN NÚMERO, PUES ALGUNOS AÑOS SE VEN MUY POCAS. LA OTRA TÓRTOLA ES LA TURCA, AVE INVASORA EN EXPANSIÓN, PERO QUE AÚN NO CRÍA EN EL CONCEJO. ES MÁS, LA HEMOS DIVISADO EN ESCASAS OCASIONES: UNA EL 20.IV.1985, UNA EL 7.XII.1987, DOS EL 27.III.1988 Y DOS EL 12.V.1990, EN ARBOLEDAS Y HUERTAS.

EL CUCO ES UN PÁJARO POPULAR POR SU POTENTE Y CURIOSA VOZ, PERO SE OBSERVA MENOS DE LO QUE SE OYE, POR SUS COSTUMBRES Y PLUMAJE CRÍPTICOS. AUN ASÍ, SI LOS PERSEGUIMOS EN LA ARBOLEDA O ANDAMOS OJO AVIZOR EN LOS PASOS MIGRATORIOS, NO SERÁ DIFÍCIL VERLO. LLEGA EN ABRIL (Y ALGUNA VEZ EN MARZO) Y LOS ÚLTIMOS SE VEN EN SEPTIEMBRE. A MEDIDA QUE AVANZA EL VERANO ES MÁS DIFÍCIL DE DETECTAR. PARASITIZA A PEQUEÑOS PAJARILLOS, CONTEMPLANDO A LOS ENANOS PADRASTROS CEBAR A SU MONSTRUOSO "HIJO", EL CUCLILLO.



BÚHOS

POCAS LECHUZAS COMUNES VAN QUEDANDO EN EL CONCEJO, RELEGADAS A LA PERIFERIA EN CASAS DISPERSAS; TODAVÍA DEBE CRIAR ALGUNA PAREJA. SON SEDENTARIAS, RESULTANDO MÁS VISIBLES A FINALES DE VERANO Y EN OTOÑO, QUIZÁ POR LA DISPERSIÓN DE JUVENILES. DE UN POSADERO ARBÓREO CON EGAGRÓPILAS EXTRAJIMOS DATOS SOBRE SU DIETA: EL 66% DE LAS PRESAS SON INSECTÍVOROS (PRINCIPALMENTE LA MUSARAÑA COMÚN), EL 33% ROEDORES (MÁS TOPILLOS QUE RATONES) Y EL 1% PAJARITOS, Y ALGÚN ESCARABAJO.

EL AUTILLO ES MUY DIFÍCIL DE VER, LO QUE CONTRASTA CON LA FACILIDAD DE OIR SU VOZ... ¡OJO! MUCHO CUIDADO CON EL PARECIDÍSIMO SONIDO DEL SAPO PARTERO. LLEGAN AVANZADA LA PRIMAVERA Y LOS ÚLTIMOS PARTEN EN SEPTIEMBRE (PARECE HABER UN PASO OTOÑAL). DURANTE LAS NOCHES ESTIVALES SE LE ESCUCHA EN ALGUNOS PARQUES Y ARBOLEDAS DE VARIAS ZONAS DEL CONCEJO. DESCONOCEMOS SI CRÍA AQUÍ ALGUNA PAREJA.



MOCHUELO

CONOCEMOS MEJOR AL MOCHUELO, PUES SE LE SUELE VER DE DÍA EN SUS TERRITORIOS (CASAS DISPERSAS, HUERTAS). HAY VARIAS PAREJAS AFINCADAS EN EL CONCEJO, SOBRE TODO EN LA ZONA OCCIDENTAL. PARECE SER MUY FIEL A LOS TEJADOS DONDE MORA, LO CUAL COMPROBAMOS EN UNA CASITA CERCANA A LAS MEANAS (EN 1983 LA CASA FUE DERRIBADA Y LAS AVES SE FUERON). EN UN POSADERO OBSERVAMOS RESTOS DE TRES RATONES Y DE UN ELEVADO NÚMERO DE GRILLOS Y SALTAMONTES.

OTRA RAPAZ NOCTURNA

BASTANTE CONOCIDA ES EL CÁRABO, SEDENTARIO EN EL CONCEJO, COMO LA ESPECIE ANTERIOR. HAY VARIAS PAREJAS EN AVILÉS; LA MÁS FAMOSA FUE LA QUE CRIO EN EL PARQUE DE FERRERA (HASTA QUE SE MODIFICÓ LA ZONA AL EDIFICAR LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL), DE LA QUE PODÍAN OBSERVARSE LAS POLLADAS ANUALES DESCANSANDO TRANQUILAMENTE EN UN ÁRBOL. TAMBIÉN EN OTROS PARQUES SE ESCUCHA EN VERANO SU CARACTERÍSTICA VOZ. EN UN INTERESANTE BOSQUETE CERCANO A HEROS, ANALIZAMOS 66 GRÓPILAS Y OBTUVIMOS QUE EL 63% DE SUS PRESAS SON ROEDORES, EL 14% INSECTÍVOROS Y EL RESTO PEQUEÑAS Y MEDIANAS AVES. TAMBIÉN SUELE INGERIR ESCARABAJOS.



CHOTACABRAS Y VENCEJO

EL CHOTACABRAS GRIS ES UN BICHO DIFÍCIL DE VER; SÓLO SE LOCALIZA POR SU CARACTERÍSTICA VOZ O SI SE TIENE LA SUERTE DE LEVANTARLO (CUANDO CASI LO PISAS). ES POCO CONOCIDO, DEBIDO A SUS COSTUMBRES CREPUSCULARES Y NOCTURNAS. EN VERANO SE ENCUENTRA SOBRE TODO EN LOS PRADOS CON ARBUSTOS DEL OCCIDENTE DEL CONCEJO. SE PRODUCE PASO EN SEPTIEMBRE. ES CASI SEGURO QUE CRÍA ALGUNA PAREJA.

¿QUIÉN NO CONOCE AL VENCEJO COMÚN? ESE PÁJARO NEGRO, RAPIDÍSIMO Y CHILLÓN, FRECUENTE EN VERANO, ES FAMILIAR PARA CUALQUIERA. A MEDIDA QUE PASAN LOS AÑOS OBSERVAMOS ANTES A LAS PRIMERAS AVES; ASÍ, EN 1985 LLEGÓ A MEDIADOS DE MAYO, EN 1988 A PRIMEROS DE MAYO Y EN 1990 A FINALES DE ABRIL. LA MAYORÍA SE MARCHAN ENTRE EL 5 Y EL 10.VIII; A LO LARGO DE ESE MES VEMOS VARIAS AVES, Y ALGUNA EN SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENDO A INDIVIDUOS EN PASO MIGRATORIO. CRÍA BAJO LAS TEJAS Y EN AGUJEROS DE EDIFICIOS. AUNQUE EN UN CENSO DE 1988 ENCONTRAMOS 39 NIDOS EN EL CONCEJO, TIENE QUE HABER MÁS. LAS PRINCIPALES COLONIAS ESTÁN EN LOS BARRIOS DE VERSALLES Y LA MADALENA, ADEMÁS DE OTROS PUNTOS DISPERSOS. EN UN CENSO POBLACIONAL DE 1990 SE CONTARON 535 AVES RESIDENTES FRENTE A 223-250 DE 1988. PERO HAY QUE TENER CUIDADO EN JULIO Y AGOSTO, PUES GRANDES BANDOS PUEDEN CRUZAR SOBRE LA CIUDAD PROCEDENTES DE OTROS LUGARES: EL 21.VII. 1990, EN MENOS DE UNA HORA, CASI 600 AVES SOBREVOLARON EL QUIRINAL Y LAS MEANAS.

MARTÍN, ABUBILLA Y PICOS

EL MEJOR SITIO PARA OBSERVAR EL MAGNÍFICO COLORIDO DEL **MARTÍN PESCADOR** ES ZELUÁN: UNA O DOS AVES REGENTAN LA ZONA TODOS LOS AÑOS ENTRE AGOSTO Y ENERO, Y EN OCASIONES HASTA MARZO. DURANTE EL INVIERNO PUEDE ENCONTRARSE ALGUNO EN OTRAS ZONAS HÚMEDAS DEL CONCEJO, COMO EL RÍO VILLA. EN LA TEMPORADA 1982.83 UN AVE SE INSTALÓ EN LA MALOGRADA CHARCA CERCANA A LAS MEANAS.

NO SE QUEDA ATRÁS EN VISTOSIDAD LA PRECIOSA **ABUBILLA**. LA MAYORÍA DE LOS AÑOS VEMOS ALGUNA EN MARZO, ABRIL O AGOSTO, FUNDAMENTALMENTE EN EL OCCIDENTE DEL CONCEJO. POR DESGRACIA, SON POCAS LAS QUE PASAN POR AQUÍ Y YA TENEMOS CONSTANCIA DE UNA CAZADA.

EL PÁJARO CARPINTERO MÁS PEQUEÑO Y MIMÉTICO ES EL **TORCECUELLO**. ESTE CURIOSO ANIMAL EMITE SU INTRIGANTE Y BIEN AUDIBLE RECLAMO EN ABRIL Y MAYO; LOS PRIMEROS LLEGAN A MEDIADOS DE MARZO Y LOS ÚLTIMOS SE VAN EN JULIO, PERO PUEDE QUE ALGUNO SE QUEDA HASTA SEPTIEMBRE. CRIAN MUY POCAS PAREJAS EN BOSQUETES DEL CONCEJO. COMO OTROS PICOS, RESULTA MÁS FÁCIL OIRLO QUE VERLO.

MUY COMÚN RESULTA EL **PITO REAL**, PUES ES UNA DE LAS POCAS AVES QUE FRECUENTA LOS EUCALIPTALES. ES POSIBLE DETECTARLO INCLUSO EN CAMPO ABIERTO, PERO SOBRE TODO EN ARBOLEDAS; SU VOZ Y FIGURA EN VUELO SON CARACTERÍSTICOS. CRÍA, EN NÚMERO DESCONOCIDO, EN EL CONCEJO.

DEL **PICO PICAPINOS** TENEMOS POCAS OBSERVACIONES, EN PRIMAVERA Y VERANO, EN BOSQUETES CADUCIFOLIOS CERCANOS A HEROS Y LA MADALENA. NIDIFICA CERCA DEL CONCEJO. SU COLORACIÓN Y RECLAMO SON DISTINTIVOS.




PITO REAL

PAXAROS

EL GRUPO DE AVES MÁS VARIADO Y EXTENSO ES EL DE LOS PÁJAROS O PASERIFORMES. SON BICHOS BIEN CONOCIDOS POR SU ABUNDANCIA, SU PRESENCIA CERCA DE LAS VIVIENDAS O POR SER "TÍPICOS" DE JAULA. UNO MUY COMÚN EN LOS CAMPOS ES LA ALONDRA. SUS FAMOSOS TRINOS PRIMAVERALES SÓLO SE ESCUCHAN CON ASIDUIDAD EN UN RINCÓN DE AVILÉS: ALGUNA PAREJA CRIABA EN LAS PROXIMIDADES DE ZELUÁN (MAQUA), HASTA QUE RECIENTEMENTE HA SIDO TRANSFORMADA TODA ESA CAMPERA. EN EL RESTO DEL CONCEJO ES FRECUENTE DESDE FINALES DE SEPTIEMBRE O DESDE OCTUBRE HASTA FEBRERO O INCLUSO MARZO.

LAS GOLONDRINAS COMUNES SON AVES MUY QUERIDAS POR CRIAR EN CUADRAS Y LIMPIARLAS DE MOSCAS (Y POR ALGUNA LEYENDA). EN UN CENSO DE 1988 LOCALIZAMOS 12-15 NIDOS EN EL CONCEJO, CASI TODOS EN ÁREAS RURALES OCCIDENTALES. LAS PRIMERAS LLEGAN A MEDIADOS DE MARZO Y SE MARCHAN EN SEPTIEMBRE. SE OBSERVAN MUY POCAS EN OCTUBRE, AUNQUE EN 1986 TODAVÍA HABÍA BUENOS BANDOS EN ESTE MES, Y UNA SOLA VEZ EN NOVIEMBRE (3 AVES EL 3.XI.1984).



GOLONDRINA COMÚN

DE LA OTRA GOLONDRINA, LA DAURICA, TENEMOS DOS CITAS SEGURAS: UN INDIVIDUO EL 3.V.1987 MEZCLADO EN UN BANDO DE GOLONDRINAS COMUNES, EN LA MADALENA, Y DOS AVES EL 15.VI.1989 EN LA CHARCA DE ZELUÁN. SIMILARES SON LOS AVIONES, SIENDO EL COMÚN MUY CONOCIDO POR CRIAR EN NIDOS GLOBOSOS BAJO LOS ALEROS DE LAS CASAS. EN UN CENSO EN 1988 ENCONTRAMOS 156 NIDOS OCUPADOS, 84 VACIOS Y 95 ROTOS, CON MAYOR DENSIDAD EN LOS BARRIOS DE LAS VEGAS (QUE ESTÁ DENTRO DE LA CIUDAD PERO FUERA DEL CONCEJO), VERSALLES Y LA MADALENA. COMPARÁNDOLO CON UN CENSO PARCIAL DE 1981 VEMOS QUE LA POBLACION SE HA DUPLICADO O TRIPLICADO EN SEIS AÑOS. MIGRATORIO

COMO EL RESTO DE LA FAMILIA, ES AVE QUE LLEGA TARDE, PUES LOS PRIMEROS APARECEN EN ABRIL, AUNQUE EL GRUESO ARRIBA EN MAYO. MARCHA EN SEPTIEMBRE, AUNQUE HAY ALGUNA CITA EN OCTUBRE Y UNA EN NOVIEMBRE (3 AVES EL 3.XI.1984). COMO LA GOLONDRINA, SUELE HACER DOS PUESTAS. MUY ESCASO ES EL AVIÓN ZAPADOR: SE VE ALGUNO EN ABRIL O MAYO Y EN AGOSTO O SEPTIEMBRE EN ZELUÁN Y LA DESAPARECIDA




AVIÓN COMÚN

CHARCA DE MAQUA. INCLUSO ALGUNA VEZ LO HE-
MOS PRESENCIADO EN PASO SOBRE PRADOS DEL
OCCIDENTE DEL CONCEJO.

BISBITAS Y LAVANDERAS SON AVES FRECUEN-
TES EN TODAS PARTES. UN BISBITA MUY ESCASO ES
EL RIBEREÑO COSTERO. UNA O POCAS AVES
SE VEN EN INVIERNO EN LA RÍA Y OTROS HUMEDA-
LES; PARECE HABER PASO EN FEBRERO Y MARZO.
EL BISBITA COMÚN ES MUY ABUNDANTE EN IN-
VIERNO, CON BANDOS DE MÁS DE 100 INDIVIDUOS,
BÁSICAMENTE EN PRADOS. LOS MÁS TEMPRANOS
APARECEN EN SEPTIEMBRE Y LOS ÚLTIMOS EN
ABRIL O ALGUNA VEZ EN MAYO. MUY PARECIDO ES
EL ARBÓREO, QUE LE SUSTITUYE EN VERANO. SE
PRESENTA EN LA SEGUNDA MITAD DE MARZO Y
DESAPARECE EN SEPTIEMBRE. ES FRECUENTE EN
PRADOS Y ARBOLEDAS, PERO NO FORMA BANDOS
NUMEROSOS COMO LA ANTERIOR ESPECIE. CRÍA
EN EL CONCEJO. TAMBIÉN NIDIFICA AQUÍ LA LA-


VANDERA BOYERA, QUE APARECE EN ABRIL (A VECES EN MARZO) Y SE VA EN SEPTIEM-
BRE (HAY ALGUNA CITA EN OCTUBRE). ES FRECUENTE PERO NO NUMEROSA. MUY PARECI-



BISBITA
COMÚN

DA A ÉSTA, AUNQUE MÁS LIGADA AL AGUA, ES LA CASCADENA. SUELE OBSERVARSE
SOLITARIA EN MUCHOS SITIOS ENTRE SEPTIEMBRE Y MARZO, PUES ES INVERNANTE, PERO
LA CONTEMPLAMOS EN OCASIONES EN PRIMAVERA Y VERANO POR LA RÍA Y EN RIACHUELOS
DE LA PERIFERIA DEL CONCEJO. EN LA PRIMAVERA DE 1984 UNA PAREJA SACÓ ADELANTE
DOS POLLOS CERCA DE LAS MEANAS, Y OTRA PAREJA EN LA CARRIONA EN 1988. ES POSI-

BLE QUE TODOS LOS AÑOS CRÍE ALGUNA EN LA PERIFERIA DEL CONCEJO. LA LAVANDERA BLANCA COMÚN ES SEDENTARIA Y FRECUENTE POR DOQUIER (PARQUES, CALLES, COLEGIOS,...). CRÍA EN EL CONCEJO. LA RAZA OSCURA BRITÁNICA, O ENLUTADA, ES INVERNANTE AQUÍ, DESDE LA SEGUNDA MITAD DE OCTUBRE HASTA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO, Y CORRIENTE PERO EN ESCASO NÚMERO EN LOS LUGARES CITADOS PARA LA OTRA SUBESPECIE.



LAVANDERA BLANCA COMÚN



CHOCHÍN

UNA BOLITA PARDA DE PLUMAS QUE SE ESCONDE EN LOS ARBUSTOS Y ZARZAS Y QUE EMITE UN AGUDO Y POTENTE CANTO ES EL CHOCHÍN. AVE MUY NORMAL EN CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA DE TODO EL CONCEJO, DEBE CRIAR EN BUEN NÚMERO. ES SEDENTARIO.

OTRO PÁJARO MÁS FRECUENTE DE LO QUE SE DEJA VER ES EL ACENTOR COMÚN. ES MÁS NUMEROSO EN INVIERNO, EN LOS

MATORRALES, MIENTRAS QUE EN VERANO ANIDAN UNAS POCAS PAREJAS DISPERSAS. EL FAMILIAR PETIRROJO ES MUY ABUNDANTE EN EL PASO OTOÑAL (SEPTIEMBRE Y OCTUBRE) Y EN INVIERNO, EN ZONAS CON ÁRBOLES O ARBUSTOS. EN VERANO SE VE Y OYE MUCHO MENOS; VARIAS PAREJAS CRÍAN EN EL CONCEJO. PARECIDO EN FIGURA ES EL PECHIAZUL: ÉSTE SÓLO SE HA REGISTRADO TRES VECES EN LA CHARCA DE ZELUÁN: UNO EL 12.III.1980, OTRO EN OTOÑO HACE AÑOS Y OTRO EL 11.IX.1988. EL COLIRROJO REAL ES IRREGULAR EN NÚMERO, PUES HAY AÑOS EN



COLIRROJO TIZÓN


TARABILLA COMÚN



QUE APENAS SE VE. CRÍA ESCASO EN EL CONCEJO; 1986 FUE UN BUEN AÑO, CON TRES NIDOS EN EL PARQUE DE FERRERA (EN DOS CAJAS ANIDADERAS Y EN UN MURO). LLEGA EN LA SEGUNDA MITAD DE ABRIL, Y EN ALGÚN CASO A FINALES DE MARZO, Y SE PIRA EN SEPTIEMBRE. MÁS COMÚN ES EL COLIRROJO TIZÓN, SOBRE TODO CON LA INVERNADA (ENTRE SEPTIEMBRE Y MARZO-ABRIL). MIENTRAS QUE EL ANTERIOR ES MÁS ARBÓREO Y "RURAL" ÉSTE ES MÁS "URBANÍCOLA", NIDI-FICA EN EL CONCEJO. UN PÁJARO QUE APENAS APARECE UN MES AL AÑO (EN SEPTIEMBRE) ES LA TARABILLA NORTEÑA, EN MAIZALES Y SETOS ESPECIALMENTE DEL OCCIDENTE DEL CONCEJO. TENEMOS ALGUNAS OBSERVACIONES EN AGOS-TO Y OCTUBRE. HAY DÍAS EN QUE ES MUY FRECUEN-TE, PERO NORMALMENTE ES ESCASA Y HAY AÑOS EN QUE CASI NI SE VE. LA OTRA TARABILLA, LA CO-MÚN, ES SEDENTARIA Y ABUNDANTE, PUES HAY PAREJAS EN TODOS LOS PRADOS Y SETOS; ASÍ, CRÍA


NUMEROSA. LA COLLALBA GRIS ES UN PÁJARO DE CARACTERÍSTICA POSTURA ERGUIDA, TIPO COLIRROJO, CON UNA COLA INCONFUNDIBLE. AQUÍ ÚNICAMENTE SE PRESENTA EN PASO OTOÑAL (SEPTIEMBRE Y OCTUBRE), MUY ESCASA EN PRADOS DEL OCCIDENTE DEL CONCEJO Y EN ZELUÁN. EXISTE UNA OBSERVACIÓN DE ABRIL.

MIRLOS Y ZORZALES (TORDOS) SON FAMILIARES POR SU ABUNDANCIA. UN MIRLO "RA-RILLO" ES EL CAPIBLANCO, CON UNA SOLA CITA EN MAQUA EN OCTUBRE HACE UNOS CUAN-TOS AÑOS. EL MIRLO COMÚN ES, CON EL PETIRROJO Y OTRAS POCAS AVES, UNO DE LOS



MIRLO COMÚN

TÍPICOS "PAJAROS DE JARDÍN" QUE PODEMOS VER EN CUALQUIER SITIO. SU AFLAUTADO CANTO PONE LA NOTA MELANCÓLICA EN LOS CREPÚSCULOS. CRÍA NUMEROSO EN EL CONCEJO. SE CONOCEN CASOS DE ALBINISMO PARCIAL. EL ZORZAL COMÚN ES ABUNDANTE EN INVIERNO, EN TODA ZONA CON ÁRBOLES O ARBUSTOS. LLEGA EN OCTUBRE Y PARTE EN ABRIL, PERO ALGUNAS PAREJAS PERMANECEN EN VERANO, CRIAN DO RARA VEZ EN ARBOLEDAS. DEL CHARLO HAY MUY POCAS CITAS EN INVIERNO. EL ALIRROJO SE VE ENTRE NOVIEMBRE Y FEBRERO (A VECES EN OCTUBRE Y MARZO) EN CUALQUIER TIPO DE ARBOLEDA, FORMA BANDOS NUMEROSOS, CONTÁNDOSE POR CIENTOS CON OLAS DE FRÍO. SON CARACTERÍSTICOS SU RECLAMO, SU CEJA Y EL COLOR ROJO QUE OSTENTA BAJO EL ALA. SÓLO ALGUNOS INVIERNOS VEMOS ZORZALES REALES, SOBRE TODO SI HACE MUCHO FRÍO. APARECEN ENTONCES ALGUNAS AVES EN ENERO Y FEBRERO EN EL OCCIDENTE DEL CONCEJO, EN ZELUÁN Y EN



ZORZAL COMÚN

MAQUA. EN LA FUERTE NEVADA DEL I. 1987 UNA OLEADA CONTINUA INVADIÓ TODO EL CONCEJO DURANTE VARIOS DÍAS, CONTÁNDOSE 120 AVES EN SÓLO DOS SITIOS Y DURANTE UN RATITO (PERO SEGUÍAN PASANDO). ESE AÑO SE VIERON HASTA MARZO.


EL RUISEÑOR BASTARDO ES SEDENTARIO EN ZONAS DE VEGETACIÓN ESPESA, SIENDO DIFÍCIL DE OBSERVAR BIEN, AUNQUE ES FÁCIL ESCUCHAR SU CARACTERÍSTICO RECLAMO. RESULTA MÁS ABUNDANTE EN INVIERNO. DEBE CRIAR EN EL CONCEJO. SI EN PRIMAVERA OÍMOS UN PIIDO INTERMITENTE EMITIDO POR UN PAJARÍN DE VUELO ONDULADO, NO HAY DUDA ¡ES UN BUITRÓN!. DESDE LUEGO, SU NOMBRE ES LA ANTÍTESIS DE LA REALIDAD EN ESTE MINÚSCULO PAJARILLO. FRECUENTE EN CAMPERAS Y EN ZELUÁN, PARECE MÁS ESCASO EN INVIERNO. NIDIFICA EN EL CONCEJO. OTRO BICHITO QUE SE ESCUCHA EN LOS MATORRALES MUCHO MÁS DE LO QUE SE VE ES LA BUSCARLA PINTOJA. LLEGAN A FINALES DE MARZO Y LAS ÚLTIMAS APARECEN EN JULIO (POR LA DIFICULTAD EN LOCALIZARLAS; QUIZÁ PERMANEZCAN MÁS TIEMPO).

PROBABLEMENTE CRÍA EN EL CONCEJO. CANTA DESDE UNA RAMA O EN LA SUPERFICIE DE UN ARBUSTO, CON EL PICO ABIERTO Y MOVIENDO LA CABEZA DE UN LADO A OTRO; CUANDO CESA SU MONÓTONO CANTO SE CONVIERTE EN UN FANTASMA. DEL BARULLO DE CARRICEROS Y CARRICERINES, SÓLO HAY NOTICIAS DEL CARRICERÍN COMÚN; SE DIVISÓ ALGUNA VEZ EN PRIMAVERA EN LA DESAPARECIDA CHARCA DE MAQUA Y EN CONTAS OCASIONES EN OTOÑO EN ZELUÁN Y MAQUA. EL AMARILLÍN ZARCERO COMÚN ES FÁCIL DE LOCALIZAR EN PRIMAVERA EN MUCHOS PUNTOS ARBUSTIVOS DEL CONCEJO, PUES EMITE UN CARACTERÍSTICO CANTO DESDE UN POSADERO DESCUBIERTO. ES DISPERSO Y POCO NUMEROSO ENTRE MEDIADOS DE MAYO Y MEDIADOS DE AGOSTO. DEBE CRIAR EN LA COMARCA.

LAS CURRUCAS SON UN GRUPITO MUY DIVERSIFICADO, PERO AQUÍ ÚNICAMENTE APARECEN CUATRO ESPECIES. LA RABILARGA ES MUY ESCASA EN INVIERNO Y DIFÍCIL DE CONTROLAR, YA QUE SE ESCONDE EN EL INTERIOR DE MATORRALES. CRÍA CERCA DEL CONCEJO. CON UNAS TONALIDADES MUY SIMPLES Y UNIFORMES, LA MOSQUITERA ES TAMBIÉN DIFÍCIL DE VER, PUES ADEMÁS HABITA ENTRE ABUNDANTE VEGETACIÓN AUNQUE PODEMOS DETECTARLA POR SU CANTO. ES MUY RARA EN VERANO, DE MAYO A SEPTIEMBRE, EN EL OCCIDENTE DEL CONCEJO. NO SABEMOS SI CRÍA ALGUNA PAREJA. LA ZARCERA SE PRESENTA EN LOS PASOS MIGRATORIOS (MAYO Y ESPECIALMENTE SEPTIEMBRE); HAY ESCASAS OBSERVACIONES ESTIVALES, POR LO QUE AL SER DIFÍCIL DE DETECTAR LA, COMO LAS RESTANTES CURRUCAS, CABE LA POSIBILIDAD DE QUE ALGUNA PAREJA ANIDE AQUÍ. LA MÁS COMÚN DE LAS CURRUCAS ES LA CAPIROTADA, FRECUENTE Y NUMEROSA EN CUALQUIER LUGAR CON ABUNDANTE VEGETACIÓN, INCLUSO LOS EUCALIPTALES. PARECE MÁS FÁCIL DE VER EN INVIERNO. CRÍA EN BUEN NÚMERO POR EL CONCEJO.

LOS MOSQUITEROS TAMBIÉN SON UN GRUPO NUMEROSO CON ESCASA REPRESENTACIÓN POR AQUÍ. DEL PAPIALBO SOLAMENTE HAY UNA CITA ESTIVAL DE HACE AÑOS EN EL PARQUE DE FERRERA. EL MUSICAL SE VE EN LOS PASOS (ABRIL Y MAYO, Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE) EN MUCHOS LUGARES CON ARBUSTOS. Y COMO ERA DE ESPERAR, EL MÁS COMÚN ES EL MOSQUITERO COMÚN. EN ESTA ESPECIE SE PRODUCE UNA COSA CURIOSA: ES ABUNDANTE EN INVIERNO POR TODOS LADOS Y ESCASO Y LOCALIZADO EN VERANO, PERO SE PRODUCE UN RECAMBIO DE POBLACIONES, PUES LOS INVERNANTES PERTENECEN A LA SUBESPECIE BRITÁNICA Y LOS VERANEANTES A LA RAZA IBÉRICA; ESTA TRANSICIÓN SE DA EN ABRIL-MAYO Y SEPTIEMBRE-OCTUBRE. DEBE CRIAR EN EL CONCEJO. TAMBIÉN PEQUEÑOS E INQUIETOS SON LOS REVEZUELOS. AL SENCILLO SÓLO NOS LO TROPEZAMOS UNA VEZ: DOS AVES EL 16. XII. 1983 EN EL PARQUE DE FERRERA. EL LISTADO ES ABUNDANTE EN INVIERNO EN ARBOLEDAS, PERO ESCASO Y LOCALIZADO EN VERANO. SEGURAMENTE CRÍA AQUÍ.

SON VISIBLES DOS PAPAMOSCAS: EL GAIS Y EL CERROJILLO. EL PRIMERO ES MUY ESCASO, EN VERANO EN BOSQUES DEL LÍMITE OCCIDENTAL DEL CONCEJO (DONDE DEBE CRIAR ALGUNA PAREJA) Y EN PASO OTOÑAL (SEPTIEMBRE). EL SEGUNDO PROTAGONIZA UNA OLA INVASORA DURANTE EL OTOÑO (DE AGOSTO A OCTUBRE, PERO BÁSICAMENTE EN SEPTIEMBRE), VARIANDO SU ABUNDANCIA DE UN AÑO A OTRO; A VECES, HAY DÍAS EN SEPTIEMBRE EN QUE ES UNA AUTÉNTICA PLAGA. ALGUNOS AÑOS SE DIVISA ALGUNO EN ABRIL, EN EL PASO PRIMAVERAL.




CARBONERO COMÚN

UN GRUPO DE PAJAROS SIMPÁTICOS, DE COLORES VIVOS, ALEGRES, MALABARISTAS E INTELIGENTES, SON LOS PÁRIDOS. ALGUNOS SON "PAJAROS DE JARDÍN". EL MÁS FAMILIAR ES EL CARBONERO COMÚN. ABUNDA POR TODO TIPO DE VEGETACIÓN ARBÓREA Y ARBUSTIVA, PRINCIPALMENTE EN INVIERNO, PERO TAMBIÉN EN VERANO SE ENCUENTRA EN MUCHOS SITIOS. CRÍAN UNAS CUANTAS

PAREJAS. EL CARBONERO GARRAPINOS, MÁS ESCASO QUE EL ANTERIOR, APARECE EN INVIERNO EN TODO TIPO DE ARBOLEDAS; EN VERANO ES INFRECUENTE Y LOCALIZADO, ANIDANDO MUY POCAS PAREJAS EN LA COMARCA. EN EL PARQUE DE FERRERA NIDIFICÓ EN 1984 UNA PAREJA EN UN MURO, Y AL AÑO SIGUIENTE EN UNA CAJA ANIDADERA. EL HERRERILLO COMÚN ES UN PRECIOSO PAJARÍN QUE POR DESGRACIA ES ESCASO E IRREGULAR EN INVIERNO. A VECES VEMOS ALGÚN BANDO CURIOSO EN OTOÑO, PERO SUELE PRESENTARSE EN BAJO NÚMERO; AUN ASÍ HAY AÑOS BUENOS EN LOS QUE SE VE EN CUALQUIER ARBOLEDA. EN VERANO HAY MUY POCAS PAREJAS LOCALIZADAS EN EL OCCIDENTE DEL CONCEJO (CRÍA MÍNIMA). AL HERRERILLO CAPUCHINO SÓLO LO VIMOS TRES VECES EN LA PERIFERIA OCCIDENTAL DEL CONCEJO: TRES AVES EL 30.VI. 1983, DOS EL 2.VIII.1987 Y DOS EL 27.XII.1987. ADEMÁS, HAY ALGUNA OBSERVACIÓN OTOÑAL EN EL PARQUE DE FERRERA DE HACE UNOS CUANTOS AÑOS. EL MITO ES OTRA PASADA DE PAJARILLO: UNA BOLITA DE PLUMAS CON LA COLA MUY LARGA; PERO COMO OTRAS BELLEZAS ES POCO HABITUAL E IRREGULAR EN OTOÑO E INVIERNO. SE MUEVE GENERALMENTE EN BANDOS, APARECIENDO EN LOS PUNTOS BOSCOSOS. UNA PAREJA CRÍA EN UN BOSQUE PRÓXIMO A LA CARRIONA.

DE LOS PEQUEÑOS TREPATRONCOS SE HAN ENCONTRADO DOS ESPECIES: EL TREPADOR AZUL Y EL AGATEADOR COMÚN. DEL PRIMERO ÚNICAMENTE SE OBSERVÓ UN INDIVIDUO VARIAS VECES EN EL INVIERNO DE 1981, EN EL PARQUE DE FERRERA. EL AGATEADOR ES RARO EN ARBOLEDAS DURANTE EL OTOÑO Y EL INVIERNO, SOBRE TODO EN EL OCCIDENTE DEL CONCEJO. EN EL PARQUE DE FERRERA VIMOS UNO EL 19.IX. 1985. UNA PAREJA CRÍA EN LA MADALENA Y OTRA EN HEROS.

LA OROPÉNDOLA ES DIFÍCIL DE OBSERVAR, AL HABITAR DENTRO DE LAS COPAS DE LOS ÁRBOLES, DONDE QUEDA MIMETIZADO SU LLAMATIVO PLUMAJE; PERO SU CANTO ES DISTINTIVO. SE DETECTA MÁS DURANTE LOS PASOS MIGRATORIOS (EN MAYO Y EN SEPTIEMBRE), QUEDANDO ALGUNAS EN VERANO. CRÍAN MUY POCAS PAREJAS, MAYORITARIAMENTE EN EL ÁREA OCCIDENTAL DE LA COMARCA.



ALCAUDÓN DORSIRROJO

MUY VISIBLES SON LOS ALCAUDONES, POR SU COSTUMBRE DE ELEGIR DESPEJADOS POSADEROS. EL MÁS GRANDE, EL REAL, SUELE IMITAR A OTROS PAJAROS PARA ATRAERLOS Y CAZARLOS. CONTEMPLAMOS ALGUNOS INDIVIDUOS ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE (SOBRE TODO EN SEPTIEMBRE); DURANTE EL OTOÑO Y HASTA MEDIADOS DEL INVIERNO PERMANECIÓ UN AVE EN 1985.86 Y 1986.87 CERCA DE HEROS. MÁS COMÚN ES EL DORSIRROJO: LLEGA EN LA SEGUNDA MITAD DE MAYO Y LOS ÚLTIMOS SE REGISTRAN EN SEPTIEMBRE, AUNQUE HAY VARIAS OBSERVACIONES A PRINCIPIOS DE OCTUBRE. UNAS CUANTAS PAREJAS ANIDAN EN ARBUSTOS POR TODO EL CONCEJO (ALGUNOS AÑOS LA NIDIFICACIÓN ES ESCASA).

LOS Córvidos son conocidas aves de "MAL AGÜERO", LO MISMO QUE LOS BÚHOS, CUYOS EFECTOS SE CREEN SÓLO NEGATIVOS. EL ARREDAJO ES EL CHILLÓN VIGILANTE DE LOS BOSQUES; AQUÍ SOLAMENTE SE DETECTA EN ZONAS ARBOLADAS DE LA PERIFERIA DEL CONCEJO. PARECE ESTAR EN EXPANSIÓN DESDE LOS CONCEJOS CIRCUNDANTES. LA URRACA ES UN INQUILINO URBANO OMNIPRESENTE, OPORTUNISTA Y A LA VEZ DES CONFIADO, CUYA FIGURA Y CONTRASTE BLANQUINEGRO ALEGRA EL OCRE TONO DEL CIE-

LO. SEDENTARIA Y NUMEROSA EN TODAS PARTES, SE REUNE AL ANOCHECER EN VARIOS DORMIDEROS COMUNALES (UNO CON MÁS DE 200 AVES ESTÁ EN EL PARQUE DE FERRERA). CRÍA, EN NÚMERO INDETERMINADO, EN EL CONCEJO. LA CORNEJA NEGRA ES TAMBIÉN ABUNDANTE, PERO NO FRECUENTA LA CIUDAD COMO LA ANTERIOR. ES UNA DE LAS POCAS AVES QUE UTILIZA LOS EUCALIPTALES, DONDE TAL VEZ CRÍE. AL ATARDECER, CERCA DE 200 AVES (Y EN UNA OCASIÓN UNAS 600) CONVERGEN EN UN DORMIDERO DE ALTOS EUCALIPTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA; DESDE LUEGO, NO TODAS ESAS AVES RESIDEN AQUÍ DURANTE EL DÍA, POR LO QUE DEBEN INCLUIR FRACCIONES DE LOS CONCEJOS VECINOS. DOS PAREJAS DE CUERVOS


CRÍAN MUY CERCA DEL CONCEJO, POR LO QUE SON ESTAS AVES LAS QUE VEMOS SOBREVOLÁNDOLO EN CUALQUIER ÉPOCA Y LUGAR... SOBRE TODO EN LA PERIFERIA, CLARO.



URRACA

LOS ESTORNINOS SON ESOS BICHOS NEGROS QUE VAN EN GRUPOS, PASANDO DE MUCHAS COSAS, DESCONFIADOS, Y SILBANDO DE UNA MANERA QUE YA QUISIERA SABER ALGUNO. LAS DOS

CORNEJA NEGRA



ESPECIES MÁS COMUNES ANDAN POR AQUÍ. LOS PINTOS NOS "INVADEN" DESDE EUROPA EN OTOÑO E INVIERNO (DE SEPTIEMBRE A MARZO-ABRIL), VIÉNDOSE EN MUCHOS SITIOS. COMO EXCEPCIÓN, EL VERANO DE 1983 UNA PAREJA INTENTÓ, SIN ÉXITO, CRIAR EN UN JARDÍN DE LA MADALENA. MUY DIFÍCIL DE DISTINGUIR (A NO SER QUE ESTÉ BIEN CERCA) DEL ANTERIOR, EL NEGRO

ES SEDENTARIO AQUÍ: EN UN CENSO DE 1990 LA POBLACIÓN ESTIVAL FUE DE 67 AVES, EL 31,5% JÓVENES. ESTOS ESTORNINOS RESIDENTES VAN A DORMIR A LAS TORRES DE LA IGLESIA DE SABUGO Y CRÍAN EN LOS TEJADOS DE ALGUNAS CASAS DE CAMPO DISPERSAS Y, PRINCIPALMENTE, EN EL DEPÓSITO DE AGUA DE LA LLEDA (TOTAL, 8 A 10 NIDOS). EN INVIERNO, LAS DOS ESPECIES DE ESTORNINOS FORMAN BANDOS MIXTOS EN LOS CAMPOS.

EL PÁJARO MÁS ABUNDANTE Y CONOCIDO ES EL SIMPÁTICO "GURRIAPU", EL **GORRIÓN COMÚN**. A CASI TODOS SE NOS HA METIDO ALGUNA VEZ UN GORRIÓN EN CASA. NIDIFICA EN COLONIAS REPARTIDAS POR TODO EL CONCEJO: EN UN CENSO-ESTIMACIÓN (¡HAY QUE TENER MÁS MORAL QUE EL ALCOYANO PARA HACERLO!) DE 1990 SE OBTUVO UNA POBLACIÓN TOTAL DE 8.826 AVES. A MEDIADOS DE VERANO FORMA GRUESOS BANDOS, ALGUNOS SOBREPASAN LAS CIEN AVES, QUE MANTIENE EN OTOÑO E INVIERNO. NO SON RARAS LAS AVES CON ALGUNAS PLUMAS BLANCAS. EL **GORRIÓN MOLINERO** ES RESIDENTE PERO ESCASO Y LOCALIZADO: EN EL CENSO ANTERIOR ENCONTRAMOS 19 PAREJAS (2 EN GAXÍN, 2 EN LA LLEDA, 1 EN VALLI NIELLO, 6 EN SAN CRISTOBAL, 5 EN MIRANDA Y 3 EN EL BARRIAL). EN ZELUÁN ESTÁ LA COLONIA MÁS NUMEROSA. EL SUREÑO **GORRIÓN MORUNO** SE DEJÓ VER POR AQUÍ EN UNA OCASIÓN: DOS OBSERVACIONES EN EL XII.1984 DE UNA HEMBRA, CERCA DE LAS MEANAS Y EN EL PARQUE DE FERRERA.




GORRIÓN COMÚN



UNO DE LOS GRUPILLOS DE PÁJAROS MÁS CONOCIDOS SON LOS "DE JAULA O DE JARDÍN". ENTRE ESTOS TENEMOS AL **PINZÓN VULGAR**. ABUNDA DE OCTUBRE A MARZO POR TODAS PARTES; EN VERANO, HAY UNA PAREJA RESIDENTE EN UN BOSQUE CERCA DE HEROS, DONDE ES PROBABLE QUE CRÍE. AL **PINZÓN REAL** SÓLO LO CONTEMPLAMOS EN UNA OPORTUNIDAD: UN EJEMPLAR EN UN BANDO DE PINZONES VULGARES EL 9.II.1986 CERCA DE LA

PINZÓN VULGAR




BOCANA DE LA RÍA. UNO DE LOS MÁS PEQUEÑOS ES EL VERDECILLO. EL CANTO NUPCIAL DEL MACHO PUEDE ESCUCHARSE EN CUALQUIER SITIO CON VEGETACIÓN ARBUSTIVA O ARBÓREA. ES SEDENTARIO Y PARECE MÁS NUMEROSO EN OTOÑO, ÉPOCA EN LA QUE FORMA BANDOS. SU DIRECTO PARIENTE ES EL VERDERÓN COMÚN. ESTE TAMBIÉN SE ESCUCHA MUCHO EN PRIMAVERA, ES FRECUENTE Y, COMO EL ANTERIOR, DEBE ANIDAR EN EL CONCEJO EN NÚMERO APRECIABLE. EL LUGARNO ES UN TÍPICO BICHO INVERNANTE (DESDE LA SEGUNDA MITAD DE OCTUBRE HASTA ABRIL).

ESTÁ SUJETO A FUERTES OSCILACIONES DE UN AÑO A OTRO; HAY INVIERNOS EN QUE ES MUY ESCASO. SE MUEVE EN BANDOS DE UN ÁRBOL A OTRO, TENIENDO PREFERENCIA POR EL HUMERO; EN MUCHOS LUGARES OÍMOS SU CARACTERÍSTICO RECLAMO. DESPUÉS DEL GORRIÓN QUIZÁ EL PÁJARO MÁS POPULAR SEA EL JILGUERO. POR SUERTE ES SEDENTARIO Y NUMEROSO, CRIANDO UN BUEN NÚMERO DE PAREJAS. EN OTOÑO FORMA GRANDES BANDOS, QUE TIENEN GRAN APETENCIA POR LAS SEMILLAS DE LOS CARDOS. MÁS RARO ES EL PARDILLO COMÚN: A FINALES DE VERANO Y EN OTOÑO FORMA NUTRIDOS GRUPOS QUE SE MUEVEN POR DOQUIER, PERO EL RESTO DEL AÑO ES POCO HABITUAL. AÚN ASÍ, VEMOS ALGUNO EN NUMEROSAS ZONAS. AQUÍ CRÍAN POCAS PAREJAS. UNO DE LOS QUE TIENEN MÁS VIVOS COLORES ES EL MACHO DEL CAMACHUELO. ES UNA ESPECIE MUY ESCASA E IRREGULAR: HAY MÁS DATOS DE OTOÑO E INVIERNO, PERO TAMBIÉN LO OBSERVAMOS VARIAS VECES EN PRIMAVERA Y VERANO. APARECE EN MUCHOS TIPOS DE ARBOLEDAS Y ARBUSTOS, LLEGANDO HASTA EL PARQUE DE FERRERA. ES POSIBLE QUE ALGUNO NIDIFIQUE REGULARMENTE EN EL BORDE OCCIDENTAL DEL CONCEJO. DEL LLAMATIVO PICOGORDO SÓLO FUE VISTO UN EJEMPLAR EN EL INVIERNO DE 1981 EN EL PARQUE DE FERRERA.



VERDERÓN COMÚN



JILGUERO

LOS ESCRIBANOS SON AVES CON MACHOS DE VIVOS COLORES, Y HEMBRAS Y JÓVENES BASTANTE PARECIDOS ENTRE SÍ. EL MÁS FRECUENTE ES EL **SOTEÑO**, AUNQUE, CON TODO, ES POCO COMÚN: EN INVIERNO SE ENCUENTRA EN ZONAS ARBUSTIVAS. UNA PAREJA CRÍA EN MAQUA. APENAS ALGUNOS INVIERNOS OBSERVAMOS UNO O POCOS **ESCRIBANOS MONTESINOS** EN VARIOS PUNTOS ARBUSTIVOS. CON EL **NIVAL** ÚNICAMENTE ALUCINAMOS UNA VEZ (AL PRINCIPIO PENSAMOS QUE ERA UN CANARIO): UN INDIVIDUO EL 18.XI.1984 CERCA DE LAS MEANAS. EL **PALUSTRE** APARECE ALGÚN INVIERNO HASTA MARZO, EN PEQUEÑOS GRUPOS EN LA CHARCA DE ZELUÁN. TAMBIÉN ESCRIBANO, PERO CON UN COLORIDO BIEN DIFERENTE (MACHO "VEGETACIÓN SECA") ES EL **TRIGUERO**. ES EL MÁS COMÚN Y REGULAR DEL GRUPO. APARECE A FINALES DE MARZO Y SE VA EN SEPTIEMBRE. EN PRIMAVERA EMITE UN CANTO INCONFUNDIBLE. VARIAS PAREJAS CRÍAN EN EL CONCEJO; SUELE VERSE EN PAREJAS O GRUPOS FAMILIARES, PERO EN SEPTIEMBRE DE 1985 HUBO UN BANDO DE 30 AVES EN MAQUA.

ÍNDICE DE ESPECIES

- ABUBILLA.**- PUPA, 31
ACENTOR COMÚN.- CARDEXINA, 34
AGACHADIZA COMÚN.- GACHA, 21
 -- CHICA.- MEXAPERROS, 21
AGATEADOR COMÚN.- ESGUILÓN, 39
ÁGUILA CALZADA.- ÁGUILA LES BIESQUES, 13
 -- CULEBRERA.- ÁGUILA CULIEBRERA, 13
 -- PESCADORA.- ÁGUILA PEXERA, 13
AGUILUCHO CENIZO.- ÁGUILA D'ERGA, 13
 -- PÁLIDO.- BLANQUINA, 13
AGUJA COLINEGAA.- AGUYA RAUPRIETA, 21
 -- COLIPINTA.- AGUYA ROXA, 21-21
ALCA COMÚN.- MONXA, 27
ALCARAVÁN.- GACHEGU, 18
ALCATRAZ COMÚN.- MAZCATU, 7
ALCAUDÓN DORSIRROJO.- ESFOYADOR BERMEYU, 39-39
 -- REAL.- ESFOYADOR RIAL, 39
ALCOTÁN.- FERLAMICU, 14
ALONDRÁ COMÚN.- CALANDRA, 32
ÁNDE DE RABUDO.- CORÍU RABULLAGU, 10
 -- REAL.- CORÍU RIAL, 10-10
 -- SILBÓN.- XIBLÓN, 10
ANDARRÍOS BASTARDO.- MAZARICU CARDEXU, 22
 -- CHICO.- CIMBLARRAOS, 22
 -- GRANDE.- MAZARICU PRIETU, 22
 -- MACULADO, 22
ÁNSAR COMÚN.- GANSU, 10
ARAO COMÚN.- MONXU, 27
ARCHIBEBE CLARO.- CHIBIBÍ ÑIDIU, 22
 -- COMÚN.- CHIBIBÍ, 22
 -- FINO.- CHIBIBÍ FINU, 22
 -- OSCURO.- CHIBIBÍ PRIETU, 22
 -- PATIG. CHICO.- CHIBIBÍ PATIM. NANU, 22
ARREDAJO COMÚN.- GLAYU, 39
AUTILLO.- CURUXÍN, 29
AVEFRÍA.- CIGOREYA, 19-19
AVETORILLO, 9
AVIÓN COMÚN.- ANDARINA CULU CANDE, 32-32
 -- ZAPADOR.- ANDARINA DE RÍU, 32
AVOCETA.- AVOCETA, 17-17
AZOR.- FERRIASCU, 13
BISBITA ARBÓREO, 33
 -- COMÚN.- CHIS, 33-33
 -- RIBEREÑO COSTERO.- CHIS LLASTRERU, 33
BUITRÓN.- SALTÓN, 36
BUSCARLA PINTOJA.- CHICHARRA, 36
CAMACHUELO COMÚN.- PICAFLOR, 42
CÁRABO.- CURUXU, 29
CARBONERO COMÚN.- BRANÍN, 38-38
 -- GARRAPINOS.- BRANÍN MONXU, 38
CARRICERÍN COMÚN.- CARRICÍN, 37
CERCETA CARRETONA.- ZARCETA RONQUIELLA, 11
 -- COMÚN.- ZARCETA, 10
CERNÍCALO VULGAR.- PEÑERINA, 14-14
CIGÜEÑA COMÚN.- CIGÜEÑA, 9
CIGÜEÑUELA.- CIGÜEÑINA, 17
CODORNIZ.- PAPPAYUELA, 16
COLIMBO GRANDE.- CALÓN GRANDE, 7
COLIRROJO REAL.- TEMPLERINA, 34
 -- TIZÓN.- RAITÁN MORU, 35-34
COLLALBA GRIS.- BICHA, 35
COMBATIENTE.- ENGARDIENTE, 20
CORMORÁN GRANDE.- PUCAGÓN, 8-48
 -- MOÑUDO.- MAVEA, 8
CORNEJA NEGRA.- CUERVA, 40-40
CORRELIMOS COMÚN.- MAZARICU, 20-20
 -- DE TEMMINCK, 20
 -- FALCINELO, 20
 -- GORDO.- MAZARICU GORDU, 19
 -- MENUDO.- MAZARICU NANU, 19
 -- OSCURO.- MAZARICU D'OCLE, 20
 -- PECTORAL.- MAZARICU AMERICANU, 20

-- TRIDÁCTILO.- MAZARICU ANALAYERU, 19
 -- ZARAPITÍN.- MAZARICU FERRUÑOSU, 20
 CUICO.- CUQUIELLU, 28-28
 CUERVO.- CUERVU, 40
 CURRUCA CAPIROTADA.- PAPUDA, 37
 -- MOSQUITERA.- PAPUDA DE BARDIAL, 37
 -- RABILARGA, 37
 -- ZARCERA.- PAPOXA, 37

 CHARRÁN ÁRTICO, 26
 -- COMÚN.- GARROCHÍN, 26
 -- PATINEGRO.- CHIRRI, 26
 CHARRANCITO.- GARROCHÍN NANU, 26
 CHOCHA PERDIZ.- ARCEA, 21
 CHOCHÍN.- ZARRICA, 34-34
 CHORLITEJO CHICO.- MAZARICU CARETU, 18
 -- GRANDE.- MAZARICU PATIMARIELLU, 18-18
 -- PATINEGRO.- MAZARICU PATIPRIETU, 18
 CHORLITO DORADO.- POLLU TORDU, 18
 -- GRIS.- POLLU BUXU, 18
 CHOTACABRAS GRIS.- PAPAAROSOLLA, 30

 EIDER COMÚN.- CORÍU PINA, 12
 ESCRIBANO MONTESINO.- ESCRIBANA BERIZA, 43
 -- NIVAL.- ESCRIBANA DE ÑEVE, 43
 -- PALUSTRE.- ESCRIBANA CAPIELLA, 43
 -- SOTEÑO.- ESCRIBANA, 43
 ESMEREJÓN, 14
 ESPÁTULA.- PALETÓN, 9
 ESTORNINO NEGRO.- ESTORNÍN, 40
 -- PINTO.- ESTORNÍN PINTU, 40

 FAISÁN VULGAR.- FAISÁN, 15
 FALAROPO DE WILSON.- FALAROPU DE WILSON, 23
 -- PICOGRUESO.- FALAROPU PICOGRORDU, 23
 FLAMENCO.- FLAMENCU, 9
 FOCHA COMÚN.- FULCRE, 16
 FUMAREL CARIBLANCO, 26
 -- COMÚN, 27

GARCETA COMÚN.- GARCIA CANDIA, 8
 GARZA IMPERIAL.- GARCIA ROXA, 9
 -- REAL.- GARCIA RIAL, 9-9
 GAVILÁN.- FERRE, 13-14
 GAVIÓN.- GAVILUETU, 26
 -- CABECINEGRO, 26
 GAVIOTA ARGÉNTEA.- GAVILUETA, 25
 -- CABECINEGRA.- GAVILUETA TIESTAPRIETA, 25
 -- CANA.- GAVILUETA DEL NORDÉS, 25
 -- DE DELAWARE.- GAVILUETA DE DELAWARE, 25
 -- DE SABINE.- GAVILUETA DE SABINE, 25
 -- ENANA.- GAVILUETA NANA, 24
 -- HIPERBÓREA.- GAVILUETA CANDE, 26
 -- PATIAMARILLA.- GAVILUETA, 23-23
 -- POLAR.- GAVILUETA D' ISLANDIA, 26
 -- REIDORA.- GAVILUETA GLAYADORA, 24-24
 -- SOMBRÍA.- GAVILUETA ESCURA, 24
 -- TRIDÁCTILA.- GAVILUETA MARINANA, 25
 GOLONDRINA COMÚN.- ANDARINA, 32-32
 -- DAURICA.- ANDARINA MORA, 32
 GORRIÓN COMÚN.- GURRIÓN, 41-41
 -- MOLINERO.- GURRIÓN TESTARROXA, 41
 -- MORUNO.- GURRIÓN MORU, 41
 GRULLA COMÚN, 16

 HALCÓN ABEJERO.- VIÉSPORU, 13
 -- COMÚN O PEREGRINO.- FERRE PALOMBERU, 15-15
 HAVELDA.- CORÍU FALAMPIU, 11
 HERRERILLO CAPUCHINO.- FERRERÍN DE PICONA, 38
 -- COMÚN.- FERRERÍN, 38

 JILGUERO.- XILGUERU, 42-43

 LAVANDERA BLANCA COMUN.- LLAVANDERA, 34-34
 -- BOYERA.- LLAVANDERA MARIELLA, 33
 -- CASCADEÑA.- XINGALRAU, 33
 LECHUZA COMÚN.- CURUXA, 29
 LÚGANO.- ÚBANU, 42

 MARTÍN PESCADOR.- VERDERRÍOS, 31

MILANO NEGRO.- MILÁN, 13
 -- REAL, 13
 MIRLO CAPIBLANCO.- TORDU BRAÑERU, 35
 -- COMÚN.- ÑERBATSU, 35-35
 MITO.- RAULLARGU, 38
 MOCHUELO.- MIAGÓN, 29-29
 MOSQUITERO COMÚN.- PIOYÍN, 37
 -- MUSICAL.- PIOYINA DE RÍU, 37
 -- PAPIALBO, 37

NEGRÓN COMÚN.- CORÍU PRIETU, 11
 -- ESPECULADO, 11

OROPÉNDOLA.- FILOMENA, 39
 OSTRERO.- LLEVANTA LLAMPARES, 17-17

PÁGALO GRANDE.- CÁGALU, 23
 -- PARÁSITO.- LLADRÓN, 23
 PAGAZA PICONEGRA.- CHIRRI PICOPRIETU, 27
 -- PIQUIRROJA.- CHIRRI PICURROXU, 27
 PAÍÑO DE LEACH.- PAÍN RAUFORCAU, 7
 PALOMA BRAVÍA DOMÉSTICA.- PALOMBA, 27
 -- TORCAZ.- PALOMBU BRAVU, 28
 PAPAMOSCAS CERROJILLO.- MOSQUERU PINTU, 38
 -- GRIS.- MOSQUERU, 38
 PARDELA PICHONETA.- PARDIELLA, 7
 -- SOMBRÍA.- PARDIELLA PRIETA, 7
 PARDILLO COMÚN.- PARDÍN, 42
 PATO COLORADO.- CORÍU ROXU, 11
 -- CUCHARA.- CORÍU CUYAR, 11
 PECHIAZUL.- ARCAZUERE, 34
 PETIRROJO.- RAITÁN, 34
 PICO PICAPINOS.- PICANIELLU, 31
 PICO GORDO, 42
 PINZÓN REAL.- PINPÍN RIAL, 41
 -- VULGAR.- PINPÍN, 41-42
 PITO REAL.- PICATUERU, 31-31
 POLLA DE AGUA.- GALLINETA, 16
 PORRÓN BASTARDO.- PARRU LES AMASUELES, 11
 -- COMÚN.- PARRU, 11-11

-- OSCULADO, 11

RASCÓN.- PITA MURADORA, 16
 RATONERO COMÚN.- PARDÓN, 12-13
 REYEZUELO LISTADO.- REYÍN, 37
 -- SENCILLO.- REYÍN DE FAYÉU, 37
 RUISEÑOR BASTARDO.- CHARRETA, 36

SERRETA MEDIANA.- PITORRU XERRA, 12
 SOMORMUJO CUELLIRROJO, 7
 -- LAVANCO.- SEMERGUYU, 7

TARABILLA COMÚN.- CHARCHAR, 35-35
 -- NORTEÑA.- BIRCHU BERIZU, 35
 TARRO BLANCO.- GANSO LES SABLES, 10
 TORCECUELLO.- AYAYAY, 31
 TÓRTOLA COMÚN.- RULLA, 28
 -- TURCA.- RULLA DONDA, 28
 TREPADOR AZUL.- MARTARINETE, 39
 TRIGUERO.- LLOCARINA, 43

URRACA.- PEGA, 39-40

VENCEJO COMÚN.- ANDARÓN, 30
 VERDECILLO.- VERDERÍN, 42
 VERDERÓN COMÚN.- VERDERÓN, 42-42
 VUELVEPIEDRAS.- ENTORNARRAXES, 22

ZAMPULLÍN CHICO.- SAMARGUYU NANU, 7
 -- CUELLINEGRO, 7
 ZARAPITO REAL.- ALGARAYÁN, 22
 -- TRINADOR.- ALGARAYÁN GALLEGU, 21
 ZARCERO COMÚN.- PAPOXA MARIELLA, 37
 ZORZAL ALIRROJO.- TORDU GALLEGU, 36
 -- COMÚN.- MALVÍS, 36-36
 -- CHARLO.- MALVÍS BERIZU, 36
 -- REAL.- PANIEGA, 36



CORMORÁN
GRANDE

SUBVENCIONADA POR LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE ASTURIAS