

Hora	Somormujo lavanco	Cormorán grande	Cormorán moñudo	Garceta común	Garza real	Azulón	Ostrero	Chorlitejo grande	Correlimos común	Correlimos tridáctilo	Correlimos zarapitín	Zarapito trinador
7:30				1	1		1	16	14	8	1	1
8		0				11	1	24	15	2	1	1
9	1	5				12	1	27	27	2	1	1
10	1	7		1		9	1	27	31	2	1	1
11	1	8		3	2	8	1	22	27		1	1
12	1	10		3	1	9	1	20	16		1	1
13		10		2	1	6	1	15	12			1
14		14	1	2		11		12	14			1
15		13		3		5	1	40	32	3		
16		11		1		3	1	30	37	3	1	
17		7	1	1			1	52	48	3	1	1
18		9					1	58	53	2		1
19		8					1	35	35			1
20		7		1			1	42	41			1
20:45		0						23	31			1

Hora	Archibebe común	Archibebe claro	Andarríos chico	Vuelvepi edras	Gavión	Gaviota argétea	Gaviota patiamarilla	Gaviota sombría	Gaviota reidora	Gaviota cabecinegra	Estado marea	Observador
7:30			4	1			4	7	44		pleamar	Iván
8			4				8	13	122	2	alta	Iván
9	2	11	6				7	11	356	3	alta	Iván
10	2	10	6	1	1	1	nc	nc	nc	1	bajando	Jorge
11	2	10	4	1	1	1	nc	nc	nc	2	bajando	Jorge
12		10	4	1	2	1	nc	nc	nc	6	baja	Jorge
13	2	9	3		2	1	89	69	377	10	bajamar	César
14		4	1		2		116	74	375	5	baja	César
15	2	6	1		2	1	133	52	144	0	subiendo	César
16	2		3		1	1	133	19	0		alta	Fran
17	3		5		1	1	8	2	0		alta	Fran
18			2				2	1	0		alta	Fran
19			2				1	0	0		alta	David
20	1		3	1			1	0	0		pleamar	David
20:45	1		4	1			1	0	0		alta	David

Comentarios finales: durante la bajamar, hay limícolas que quedan ocultos entre las piedras del fondo y no se censan; aunque sí hubo paso de tarde.

Los censos realizados antes del mediodía infraestiman los cormoranes. Las mareas son determinantes para censar archibebe claros y gaviotas (más en bajamar).