


Sudáfrica – Avilés – Groenlandia/Siberia

En contacto a través de la ruta del atlántico este

Ruta migratoria del correlimos gordo a lo largo del Atlántico Este

Esta misma ruta también es seguida por otras muchas aves limícolas como el correlimos tridáctilo o el vuelvepedras.

Red knot migration along the East Atlantic flyway



Correlimos gordo en Zeluán con plumaje nupcial



Correlimos gordo en Zeluán con plumaje invernal

Cada año se registra la llegada a la Ensenada de Llodero de bandos de correlimos gordos, especialmente en la primera quincena de mayo (hacial el norte) y en la primera quincena de septiembre (hacia el sur).

Sudáfrica – Avilés – Groenlandia/Siberia

En contacto a través de la ruta del atlántico este


La ría de Avilés es un lugar estratégico de gran importancia dentro de la ruta migratoria del atlántico este, seguida por numerosas especies de aves limícolas.

En el paso migratoria primaveral, camino de las zonas de cría en regiones árticas y subárticas, la ensenada de Llodero en la ría de Avilés es uno de los mejores lugares del Cantábrico para observar estas aves.


El mes de mayo es el mes en el que se pueden hacer los avistamientos más numerosos, aunque es en el mes de septiembre cuando se puede ver un mayor número de especies en un mismo día.



Número máximo de limícolas en un día durante el paso prenupcial



Número máximo de especies de limícolas en un día durante el paso prenupcial




AVILÉS (España) y SCHIERMONNIKOOG (Holanda)

En contacto a través de la Garceta común BB



Esta garceta fue anillada siendo aún un pollo en la isla holandesa de Schiermonnikoog. Cada año pasa el invierno en la ría de Avilés y vuelve en primavera a la zona donde nació. Abajo se muestran dos cuadros con los datos recogidos gracias a esa anilla.



**anillada como pollo
en Schiermonnikoog (Holanda)**

el 18.06.04

**y vista posteriormente en el
mismo lugar**

el 19.09.09

el 11.09.10

el 18.09.11



**vista en Avilés en las
siguientes fechas:**

del 12.11.04 al 26.04.05,

del 27.10.05 al 28.04.06,

del 20.10.06 al 24.04.07,

del 24.10.07 al 24.04.08,

del 22.10.08 al 24.04.09,

del 18.10.09 al 03.05.10,

del 18.10.10 al 10.04.11,

del 20.10.11 al 27.04.12

AVILÉS (España) y FARSUND (Noruega) AVILÉS (España) y REYKJAVIK (Islandia)



En las colonias de cría de gaviota sombría en Noruega, se anillaron varios ejemplares en julio de 2001.

Ese mismo año, una de ellas fue vista cerca del nido el 8 de septiembre; el día 15 fue vista en Groningen (Holanda) y el día 26 en Avilés. Recorrió más de 2000km con menos de 3 meses de vida.

En septiembre de 2001 se vieron otros dos ejemplares más nacidos en Noruega unos meses antes.



Una aguja colinegra, marcada con anilla XXX en Reykjavik el 27-04-2002, se ha visto desde entonces pasar los inviernos en Bretaña (Francia) y los veranos en Islandia.

En 2011, fue vista por última vez en Islandia el 25 de julio; del 12 al 15 de agosto se le pudo ver en la Ensenada de Llodero (Avilés); más de 2500 km. en 18 días.